

<<儿科护理手册>>

图书基本信息

书名：<<儿科护理手册>>

13位ISBN编号：9787030295194

10位ISBN编号：7030295196

出版时间：2011-1

出版时间：科学

作者：赵秀芳 编

页数：468

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<儿科护理手册>>

内容概要

本书是《临床护理指南丛书》之一，共15章，分别为：儿童护理、生长发育、营养及营养障碍性疾病患儿护理、新生儿与新生儿疾病患儿护理、呼吸系统疾病患儿护理、消化系统疾病患儿护理、循环系统疾病患儿护理、血液系统疾病患儿护理、泌尿系统疾病患儿护理、神经系统疾病患儿护理、内分泌系统疾病患儿护理、风湿性疾病患儿护理、遗传代谢性疾病患儿护理、感染性疾病患儿护理和小儿急救。

本书涵盖了儿童护理基本理论知识及儿科临床上常见病和多发病患儿的护理，适合广大护理同仁阅读，尤其适用于各级儿科护理人员阅读。

书籍目录

第一章 儿童护理 第一节 儿科护理特点 第二节 儿童保健与计划免疫 第三节 住院患儿的护理第二章 生长发育 第一节 生长发育概述 第二节 生长发育评估 第三节 发展中常见的问题 第四节 游戏在生长发育中的作用第三章 营养及营养障碍疾病患儿的护理 第一节 儿童营养与喂养 第二节 营养不良 第三节 小儿肥胖症 第四节 维生素D缺乏性佝偻病 第五节 维生素D缺乏性手足搐搦症第四章 新生儿与新生儿疾病患儿的护理 第一节 概述 第二节 正常足月儿和早产儿的特点与护理 第三节 常见新生儿疾病的护理 第四节 新生儿重症监护第五章 呼吸系统疾病患儿的护理 第一节 急性上呼吸道感染 第二节 急性支气管炎 第三节 急性感染性喉炎 第四节 小儿肺炎 第五节 支气管哮喘 第六节 急性呼吸衰竭第六章 消化系统疾病患儿的护理 第一节 口炎 第二节 小儿腹泻 第三节 婴儿肝炎综合征 第四节 小儿液体疗法与护理第七章 循环系统疾病患儿的护理 第一节 先天性心脏病 第二节 几种常见的先天性心脏病 第三节 病毒性心肌炎 第四节 充血性心力衰竭第八章 血液系统疾病患儿的护理 第一节 小儿贫血概述 第二节 营养性贫血 第三节 再生障碍性贫血 第四节 溶血性贫血 第五节 急性白血病患儿的护理 第六节 出血性疾病第九章 泌尿系统疾病患儿的护理 第一节 急性肾小球肾炎 第二节 原发性肾病综合征 第三节 泌尿道感染 第四节 急性肾衰竭第十章 神经系统疾病患儿的护理 第一节 小儿惊厥 第二节 病毒性脑炎和脑膜炎 第三节 化脓性脑膜炎 第四节 急性感染性多发性神经根炎 第五节 癫痫 第六节 脑性瘫痪第十一章 内分泌系统疾病患儿的护理 第一节 小儿先天性甲状腺功能减低症 第二节 小儿糖尿病第十二章 风湿性疾病患儿的护理 第一节 风湿热 第二节 幼年类风湿关节炎 第三节 川崎病 第四节 过敏性紫癜第十三章 遗传代谢性疾病患儿的护理 第一节 唐氏综合征 第二节 苯丙酮尿症第十四章 感染性疾病患儿的护理 第一节 麻疹 第二节 水痘 第三节 流行性腮腺炎 第四节 流行性乙型脑炎 第五节 急性传染性单核细胞增多症 第六节 手—足—口病 第七节 中毒性细菌性痢疾 第八节 猩红热 第九节 结核病第十五章 小儿急救 第一节 急性中毒 第二节 小儿心肺复苏

章节摘录

版权页：插图：4.头围头围指经眉弓上方、枕后结节绕头一周的长度，与脑和颅骨的发育密切相关。

(1) 头围的生长发育规律：新生儿出生时头围平均为34cm；6个月时42~44cm；1周岁时约46cm；2周岁时约48cm；此后头围增长速度缓慢。

5周岁时约50cm；15周岁时54~58cm（接近成人）。

头围测量在2岁前最有价值。

(2) 头围测量方法：被测量者坐或立位，测量者用左手拇指固定软尺零点于头右侧齐眉弓上缘处，紧贴皮肤，头发较长者在软尺经过处将头发上下分开，沿头右侧经枕骨粗隆最高处再经头左侧回至零位，精确读数至0.1cm。

测得较小的头围常提示脑发育不良，增长过快提示脑积水。

5.胸围沿乳头下缘水平绕胸一周的长度为胸围。

(1) 胸围的生长发育规律：胸围的大小与肺、胸廓骨骼、胸部肌肉、皮下脂肪密切相关，反映了儿童的营养状况。

出生时胸围平均32cm，呈桶状。

1岁头围和胸围相等，以后胸围超过头围。

1岁左右头围和胸围的增长曲线形成交叉。

交叉时间与小儿营养和胸廓发育有关。

1岁至青春期，胸围超过头围的厘米数约等于小儿岁数减1。

(2) 胸围的测量方法1) 婴儿取卧位，3岁以上的儿童取立位。

2) 测量者左手拇指固定软尺零点于被测者右乳头下缘，右手绕过被测者身后拉软尺经两肩胛骨下缘（软尺紧贴皮肤但不可过紧）至左侧回到零点。

3) 取平静呼、吸气时的均值，精确读数至0.1cm。

6.腹围平脐（小婴儿以剑突与脐之间的中点）水平绕腹一周的长度为腹围。

2岁前腹围与胸围相等，2岁后则腹围较胸围小。

患腹部疾病如有腹水时需测量腹围。

测量时婴儿取卧位，软尺零点固定于剑突与脐连线中点，经同一水平绕腹一周至零点。

儿童则为平脐绕腹一周，读数记录至0.1cm。

<<儿科护理手册>>

编辑推荐

《儿科护理手册》：临床护理指南丛书。

<<儿科护理手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>