

<<图解神经病学诊断与治疗>>

图书基本信息

书名：<<图解神经病学诊断与治疗>>

13位ISBN编号：9787117123532

10位ISBN编号：7117123532

出版时间：2010-1

出版单位：人民卫生出版社

作者：R.Douglas Collins

页数：270

字数：327000

译者：谢琰臣

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<图解神经病学诊断与治疗>>

内容概要

- 1.通过易懂的彩色神经解剖插图展示疾病。
- 2.每种疾病的显著特征均以病例报告的形式逼真展现。
- 3.每个病例报告均配有病因学、诊断及治疗的概述。
- 4.为了方便查找，神经系统症状与体征的鉴别诊断均已经注明并以字母表先后为序。
- 5.诊断每种疾病需要安排的诊断学检查列于附录B。
- 6.为了方便参考，每种疾病的治疗方案都列于附录C。
- 7.罕见病，有争议的诊断及治疗均已经省略，但读者可以通过一些出色的参考文献进一步研究。

<<图解神经病学诊断与治疗>>

书籍目录

第一部分 神经科症状的鉴别诊断 神经科病史 常见神经科症状 A 暗点 B 背痛 不宁腿综合征 C 抽搐 错觉 D 大便失禁 短暂性脑缺血发作 E 噩梦 耳聋 耳鸣 F 复视 H 幻觉 昏迷 J 记忆丧失 焦虑 颈部疼痛 K 髋部疼痛 M 梦游 面部疼痛 P 排尿困难 S 上肢疼痛 上肢无力 失眠 失明 失嗅或嗅觉异常 视物不清 嗜睡 睡眠呼吸暂停 嘶哑 T 头部肿块或水肿 头痛 头晕 W 畏光 无力, 全身性 X 下肢疼痛 下肢无力 小便失禁 Y 眼痛 阳痿 遗忘 抑郁 晕厥 Z 谵妄 肢体感觉异常

第二部分 神经系统体征的鉴别诊断 常规神经系统检查 常见神经系统体征 B Babinski征和其他病理反射 步态障碍 F 反射过度活跃 反射降低 G 感觉缺失 共济失调 构音障碍 H Homer综合征 踝阵挛 J 肌肉萎缩 肌束颤动 角弓反张 颈部血管杂音 颈强直 痉挛 痉挛性笑容 L 颅内杂音 M 面神经麻痹 P 偏盲 Q 轻瘫/全瘫 R Romberg征 S 上睑下垂 失语 视乳头水肿 手足徐动 T 瞳孔扩大 瞳孔缩小 W 舞蹈症 y 眼球突出 眼球震颤 运动过度 Z 震颤

第三部分 脊髓、周围神经和肌肉疾病 B 卟啉病 D 带状疱疹 多发性硬化(病例1) 多发性硬化(病例2) 多发性硬化(病例3) E 恶性贫血 F Friedreich共济失调 腓骨肌萎缩症 G 各种单神经病 J 肌萎缩侧索硬化 肌营养不良(病例1) 肌营养不良(病例2) 急性特发性多神经病(Guillain-Barré综合征) 脊髓灰质炎 脊髓空洞症 脊髓痨 脊髓前动脉阻塞 脊髓肿瘤(病例1) 脊髓肿瘤(病例2) 脊髓肿瘤(病例3) 脊髓肿瘤(病例4) 脊椎压缩性骨折 结节性多动脉炎 颈椎病 M 梅毒性脊髓脊膜炎 Q 铅中毒性神经病变 T 糖尿病性神经病变 W 腕管综合征 X 纤维肌痛 胸廓出口综合征 Y 婴儿型脊髓性肌萎缩(werdning-Hoffmann病).....

第四部分 大脑与脑干疾病

<<图解神经病学诊断与治疗>>

章节摘录

插图：1.急性发病？

提示中耳感染、外伤或卒中。

逐渐加重的耳聋提示肿瘤、药物中毒或变性疾病，如老年性耳聋或耳硬化症。

2.一侧耳受累？

考虑中耳炎、听神经瘤、异物、外伤或梅尼埃病。

双侧受累提示耳硬化症、听神经损伤、药物中毒或扁平颅底。

3.耳痛？

耳痛最常见于感染或外伤。

无痛性耳聋见于中毒性、肿瘤性或退行性疾病。

4.耳道异常分泌物？

显而易见，提示外耳道炎或中耳炎、异物或外伤。

还应该考虑到脑脊液耳漏。

5.发热？

应该考虑感染性疾病，如中耳炎。

6.药物中毒？

庆大霉素和其他氨基糖苷类抗生素最常见，但奎宁、水杨酸和呋塞米均可引起耳聋。

7.头痛？

考虑听神经瘤或其他占位性病变。

8.眩晕？

考虑梅尼埃病、听神经瘤、多发性硬化或基底动脉阻塞或供血不足。

9.四肢无力或感觉异常？

考虑多发性硬化、脑干肿瘤或基底动脉供血不足。

10.间断性耳聋？

考虑多发性硬化、梅尼埃病或癫痫。

在查体时是否发现1.耳科检查发现异常？

考虑中耳炎或外耳道炎、异物、耵聍或胆脂瘤。

2.视乳头水肿？

考虑占位性病变，如晚期听神经瘤。

3.局限性神经系统体征？

考虑多发性硬化、脑血管病或听神经瘤。

4.Weber试验或Rinne试验异常？

Weber试验有助于判断一侧耳聋。

如果声音偏向健侧耳，考虑听神经瘤、梅尼埃病、多发性硬化或胆脂瘤所致的神经性耳聋。

如果偏向患侧耳，则考虑中耳炎或耳硬化症。

在Rinne试验中，双侧气导与骨导的比例为2：1提示听力正常。

在耳硬化症和其他传导性耳聋，该比例接近1：1，而在神经性耳聋，该比例在患侧或双侧保持2：1。

5.眼球震颤？

考虑听神经瘤、梅尼埃病或者脑干或小脑疾病。

6.非凹陷性水肿？

考虑甲状腺功能减退。

诊断检查1.测听。

2.冷热水试验。

<<图解神经病学诊断与治疗>>

编辑推荐

《图解神经病学诊断与治疗》是由人民卫生出版社出版的。

<<图解神经病学诊断与治疗>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>