

图书基本信息

书名：<<2010-口腔执业助理医师-国家医师资格考试模拟试题解析-最新修订版>>

13位ISBN编号：9787117123990

10位ISBN编号：7117123990

出版时间：2009-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：医师资格考试指导用书专家组 编

页数：181

字数：296000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

为深入贯彻《中华人民共和国执业医师法》，根据医师执业的实际需要，国家医学考试中心(以下简称中心)组织医学教育、医学考试和教育测量专家研究提出了临床、口腔、公共卫生执业医师、执业助理医师准人的基本要求，包括基本素质、基础理论和基本知识、基本技能，要求申请医师资格者不仅要具有较高的医学专业知识和能力，还要具有必要的人文素养。

根据医师准入基本要求，我中心于2008年组织对原《医师资格考试大纲》作了修改和补充，卫生部医师资格考试委员会已于2009年正式颁布并施行。

《医师资格考试大纲》包括实践技能考试大纲和医学综合笔试大纲两部分。

医学综合笔试部分将大纲考核的内容整合为基础综合、专业综合和实践综合三部分。

为帮助考生有效地掌握其执业所必须具备的基础理论、基本知识和基本技能，具有综合应用能力，能够安全有效地从事医疗、预防和保健工作，根据新大纲的要求和特点，我中心组织专家精心编写了医师资格考试系列指导丛书。

本系列指导丛书包括临床、口腔、公卫执业医师和执业助理医师二级类的《医学人文概要》、《医师资格考试医学综合笔试应试指南》、《医师资格考试实践技能应试指南》、《医师资格考试模拟试题解析》共19本，2009年已正式出版16本。

通过一年的使用，专家和广大考生反映良好，并对系列丛书提出了修改建议。

我中心再次组织有关专家对部分章节进行修订。

为体现医学人文在执业医师考试中的重要地位，提升执业医师人文精神，将原各类别《医师资格考试医学综合笔试应试指南》中有关医学伦理、医学心理与卫生法规的内容分离出来，单独成册，新编《医学人文概要》，供各类别考生使用。

同时，还首次编写口腔执业医师和口腔执业助理医师《医师资格考试实践技能应试指南》。

为了确保指导用书的内容和质量，专家们参阅了国内外权威教材，吸取了国内外公认的实际工作中普遍应用的新知识、新技能。

经过修订，本系列指导丛书紧扣新大纲，内容科学，突出重点，结构合理，逻辑性强，有利于考生进行应试复习。

书籍目录

A1型题 医学基础部分 口腔医学部分 A2型题 医学基础部分 口腔医学部分 A3/A4型题 医学基础部分 口腔医学部分 B1型题 医学基础部分 口腔医学部分

章节摘录

40. 咬合垂直距离是指 A. 上下颌牙槽嵴顶之间的距离 B. 正中牙合位时面下1/3的高度
C. 瞳孔连线到口裂间距离 D. 息止颌时, 上下颌牙胎面间距离 E. 鼻底到颏底间距离
标准答案: B 试题难度: 中 认知层次: 记忆 解析: 垂直距离是指上、下颌天然牙列在正中拾位时, 面下1/3鼻底至颏底之间的垂直高度。

选项A、C、D与垂直距离无关, 选项E描述不准确。

41. 下牙列缺失后, 下颌骨改变规律中, 正确的是 A. 颌弓前段向下、向前吸收 B. 颌弓后段向上、向外吸收
C. 下颌弓逐渐变小 D. 牙槽嵴变低、变宽 E. 腭穹隆显低、浅
标准答案: A 试题难度: 中 认知层次: 解释 解析: 下牙列缺失后, 下颌骨改变规律是: 下颌牙槽骨舌侧骨板较唇颊侧薄而疏松, 吸收快而多。

牙槽骨顺牙根方向吸收, 在颌弓前段向下、向前, 在颌弓后段向下、向外吸收。

5个选项中, 只有选项A叙述正确。

42. 关于腭小凹, 叙述错误的是 A. 位于硬腭、软腭连接处 B. 腭中缝两侧对称的两个小凹
C. 是黏液导管的开口 D. 位于全口义齿基托后堤区内 E. 上颌全口义齿基托后缘应终止于此
标准答案: E 试题难度: 难 认知层次: 解释 解析: 腭小凹是位于软硬腭连接处、腭中缝两侧对称的2个或几个小凹, 是黏液腺导管的开口。

上颌全口义齿的后缘应盖过腭小凹后2mm处。

故正确答案应选E。

43. 上颌全口义齿后堤区后缘应在 A. 前颤动线以前 B. 后颤动线以前 C. 腭小凹之前
D. 前后颤动线以前 E. 软硬腭交界处稍后的软腭上 标准答案: E 试题难度: 难
认知层次: 简单应用 解析: 颤动线位于硬腭与软腭的交界处, 颤动线分为前颤动线和后颤动线。

前颤动线在硬软腭交界处, 后颤动线在软腭腱膜和软腭肌的交界处。

上颌义齿基托的后堤区应位于前后颤动线之间的区域, 基托后缘止于软硬腭交界处稍后的软腭上, 覆盖后堤区。

故正确答案选E。

44. 上颌无牙颌成品托盘的后缘应位于 A. 腭小凹处 B. 腭小凹后3~4mm C. 颤动线前2mm
D. 颤动线前1mm E. 与颤动线平齐 标准答案: B 试题难度: 中 认知层次: 简单应用
解析: 本题考查对上颌无牙颌印模范围和上颌全口义齿基托后缘位置的要求。

上颌总义齿后缘的正确位置应在翼上颌切迹与腭小凹后2mm的连线上, 即后颤动线处。

因此, 上颌无牙颌成品托盘的后缘应超过腭小凹和颤动线位置, 印模范围应取至腭小凹后3~4mm, 以保证在准确的石膏模型上确定义齿基托后缘和制作后堤区。

按A、C、D、E选项托盘后缘位置取得的印模和模型后缘范围偏前, 会导致基托后缘短或不能准确地确定基托后缘位置。

只有B选项正确。

45. 对颌牙列完整的单颌全口义齿, 在排列人工牙时, 人工牙颊舌径宽度应减小的原因是 A. 防止加速牙槽骨的吸收
B. 增加舌体空间 C. 避免咬颊、咬舌 D. 防止义齿从中缝裂开
E. 减小恶心程度 标准答案: A 试题难度: 中 认知层次: 解释 解析: 对颌牙列完整的单颌全口义齿在制作半口义齿时, 应以天然牙列为基准排列人工牙。

磨改人工牙的颌面, 使之与天然牙建立良好的牙合关系, 并且注意适当减小人工牙胎面颊舌径的宽度, 避免因天然牙牙合力过大, 加速无牙颌牙槽骨的吸收, 正确答案选A。

将人工牙的覆盖和反覆盖加大, 即可避免咬颊、咬舌, 不需要减小舌径。

口腔颌面外科学 1. 下列物品中禁用高压蒸汽灭菌的是 A. 金属器械 B. 棉球敷料 C. 明胶海绵
D. 玻璃制品 E. 插入针头排气的瓶装液体 标准答案: C 试题难度: 难 认知层次: 记忆
解析: 本试题属基本知识题。

明胶海绵不适于使用高压蒸汽灭菌, 而适用于干热灭菌法消毒。

高压蒸汽灭菌方法适用于一般器械、布类、纱布、棉花类及橡胶类等物品的消毒。

瓶装液体插入针头以后，由于能够及时排瓶内受热膨胀的气体，也可使用高压蒸汽灭菌法消毒。

2. 拔牙后易引起感染的是 A. 血友病 B. 高血压 C. 糖尿病 D. 心绞痛 E. 肝炎
标准答案：C 试题难度：易 认知层次：解释 解析：本试题属基础知识题，考核考生对拔牙禁忌证的掌握。

血友病患者凝血因子缺乏、肝炎患者除易发生交叉感染以外，还会由于肝功能不良造成凝血机制障碍，这两类疾病都易发生拔牙后出血。

而高血压和心绞痛患者拔牙时，可能因为拔牙术的刺激引发心血管系统危象。

未经控制的糖尿病患者则易发生拔牙后感染。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>