

<<皮肤科合理用药问答>>

图书基本信息

书名：<<皮肤科合理用药问答>>

13位ISBN编号：9787117136228

10位ISBN编号：7117136227

出版时间：2010-12

出版时间：靳培英 人民卫生出版社 (2010-12出版)

作者：靳培英 编

页数：613

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<皮肤科合理用药问答>>

内容概要

《皮肤科合理用药问答》由靳培英编写，主要内容包括各类皮肤病23大类，170余种皮肤病。书中有关合理用药问题有1100余条，回答的主要内容涵盖了各类皮肤病的用药原则，每种皮肤病的首选系统用药及有效的其他用药，简要的作用机制，文献举例，有效的外用药及其用法，联合用药，药物的不良反应及防治，药物的相互作用及特别注意事项等几大方面。

<<皮肤科合理用药问答>>

书籍目录

- 第一章 病毒性皮肤病第一节 单纯疱疹 (Herpes Simplex) 1.对单纯疱疹选择最佳治疗的基本原则有哪些？
- 2.对严重的原发性单纯疱疹选择哪些最佳的系统用药？
 - 3.对于免疫力低下的患者如何用药？
 - 4.单纯疱疹性脑膜炎、新生儿HSV感染等极其严重者如何用药？
 - 5.怎样治疗复发性单纯疱疹？
 - 6.有哪些药物能减少单纯疱疹的复发？
 - 7.选择治疗单纯疱疹的外用药有哪些？
 - 8.阿昔洛韦有哪些不良反应？
 - 9.应用阿昔洛韦有哪些注意事项？
 - 10.阿昔洛韦的药物相互作用有哪些？
 - 11.泛昔洛韦等药物有哪些不良反应？
 - 12.应用泛昔洛韦有哪些注意事项？
 - 13.泛昔洛韦的药物相互作用有哪些？
- 第二节 带状疱疹 (Herpes Zoster) 1.对带状疱疹的治疗原则有哪些？
- 2.怎样对带状疱疹选择最佳系统用药？
 - 3.对于眼部带状疱疹如何选用系统用药？
 - 4.选择哪些外用药治疗带状疱疹？
 - 5.怎样选择药物治疗免疫力低下患者的带状疱疹？
 - 6.治疗带状疱疹后遗症的局部用药有哪些？
 - 7.对带状疱疹后遗症选择哪些系统用药？
 - 8.加巴喷丁的不良反应有哪些？
 - 9.阿米替林有哪些不良反应？
 - 10.阿米替林有哪些注意事项？
 - 11.阿米替林有哪些药物的相互作用？
 - 12.盐酸多塞平的不良反应和注意事项如何？
- 第三节 寻常疣与跖疣 (Verruca Vulgaris and Verruca Plantaris) 1.寻常疣和跖疣选择最佳治疗的指导原则有哪些？
- 2.对寻常疣和跖疣如何选择最快的外治疗法？
 - 3.有哪些有效的外用药可以选用？
 - 4.用于系统的抗病毒药物有哪些？
 - 5.维A酸类药的不良反应及药物相互作用有哪些？
- 第四节 扁平疣 (Verruca Plana) 1.指导扁平疣的治疗原则有哪些？
- 2.对皮损数目较少的患者如何选择局部用药？
 - 3.对皮损数目较多的患者选择哪些系统用药？
 - 4.面部皮损最好选择哪些外用药？
 - 5.对顽固性病例可联合哪些免疫增强剂？
- 第五节 疣状表皮发育不良 (Epidermodysplasia Verruciformis) 1.指导疣状表皮发育不良选择用药的原则有哪些？
- 2.对疣状表皮发育不良的面部皮损选择哪些有效的局部用药？
-第二章 微生物感染性疾病第三章 真菌性皮肤病第四章 变态反应性疾病第五章 物理性皮肤病第六章 神经功能障碍性皮肤病第七章 红斑丘疹鳞屑性皮肤病第八章 无菌脓疱性皮肤病第九章 结缔组织病第十章 水疱性皮肤病第十一章 血管炎类疾病第十二章 皮下脂肪性疾病第十三章 非感染性肉芽肿第十四章 皮脂腺汗腺性疾病第十五章 毛发疾病第十六章 黏膜性疾病第十七章 营养代谢性疾病第十八章 色素性皮肤病第十九章 遗传性皮肤病第二十章 萎缩性疾病第二十一章 性传播疾病第二十二章 老年性皮肤

<<皮肤科合理用药问答>>

病第二十三章 其他皮肤病病名索引

<<皮肤科合理用药问答>>

章节摘录

版权页：插图：如分离到淋球菌，应作药敏试验，以选择有效药物治疗。

为避免再感染，应追踪性伴侣，包括在症状发作期间或确诊前2个月内与患者有过性接触的所有性伴侣，都应作淋球菌和沙眼衣原体感染的检查和治疗，同时教育患者和性伴侣，治疗未完成前或有症状时避免性接触。

淋菌性眼炎患儿应住院治疗，并检查有无播散性感染。

淋菌性附睾炎经治疗后，若3天内症状无明显改善，则应重新评价诊断和治疗；按推荐方案治疗后，睾丸肿胀与疼痛仍持续，则应作全面检查，以排除其他疾病。

淋菌性脑膜炎、心内膜炎如出现并发症，应请有关专科会诊。

感染淋球菌的新生儿的母亲及其性伴侣应根据有关要求作出诊断，并按成人淋病治疗的推荐方案进行治疗。

妊娠期感染：推荐头孢曲松250mg，肌内注射，单次给药，或大观霉素4g，肌内注射，单次给药。

妊娠期禁用喹诺酮类和四环素类药物。

对推断或确诊有沙眼衣原体感染的孕妇，推荐红霉素或阿莫西林治疗。

男性同性性行为者感染淋球菌，常发生淋菌性直肠炎。

对其治疗无特殊要求，但此人群有感染HIV、其他病毒性和细菌性性病的高度危险，因此，应做好预防咨询，以减少他们感染其他性病的危险性，建议他们至少每年作1次全面的性传播疾病检测。

淋病患者合并HIV感染时，其治疗和HIV阴性者相同。

淋菌性盆腔炎、附睾炎同时感染HIV者，如其免疫功能已受抑，治疗时注意其可能合并念珠菌及其他病原体感染，并进行针对性治疗。

<<皮肤科合理用药问答>>

编辑推荐

《皮肤科合理用药问答》：《专科合理用药问答》丛书

<<皮肤科合理用药问答>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>