

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

图书基本信息

书名：<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

13位ISBN编号：9787117150415

10位ISBN编号：7117150416

出版时间：2011-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：林志彬

页数：124

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

内容概要

《灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤》主要包括：灵芝概论、中医药学对灵芝的论述、灵芝的现代医药学研究、灵芝抗肿瘤作用的临床研究、灵芝治疗肿瘤的民间经验、灵芝抗肿瘤作用的药理研究、灵芝保护放化疗损伤的实验研究、灵芝产品等。

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

书籍目录

- 1 灵芝概论
 - 1.1 灵芝溯源
 - 1.2 灵芝的生活史
 - 1.3 赤芝、紫芝和松杉灵芝的形态特征
 - 1.3.1 赤芝
 - 1.3.2 紫芝
 - 1.3.3 松杉灵芝
 - 1.4 灵芝的人工栽培
 - 1.5 人工栽培灵芝与野生灵芝
 - 2 中医药学对灵芝的论述
 - 2.1 《神农本草经》论六芝
 - 2.2 古代学者对灵芝的科学认识
 - 2.3 古代学者评论有关灵芝的错误观点
 - 3 灵芝的现代医药学研究
 - 3.1 灵芝的化学成分
 - 3.2 灵芝的药理作用
 - 3.3 灵芝的临床应用和保健价值
 - 4 灵芝抗肿瘤作用的临床研究
 - 4.1 肿瘤治疗学现状
 - 4.2 灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤
 - 4.3 灵芝提高放化疗疗效的研究
 - 4.3.1 灵芝口服液配合化疗治疗中晚期非小细胞性肺癌
 - 4.3.2 灵芝孢子粉辅助化疗治疗消化系统肿瘤
 - 4.3.3 薄芝糖肽治疗肺癌伴癌性胸腔积液的疗效
 - 4.3.4 灵芝合剂与CD3 AK细胞合用治疗肺癌
 - 4.3.5 灵芝水煎剂治疗恶性肿瘤
 - 4.3.6 放射治疗合并口服灵芝一蚯蚓提取物对食管癌的治疗作用
 - 4.3.7 灵芝孢子油治疗前列腺癌
 - 4.4 灵芝减轻放化疗毒副作用的研究
 - 4.4.1 灵芝子实体袋泡剂减轻化疗引起的呕吐反应
 -
 - 5 灵芝治疗肿瘤的民间经验
 - 6 灵芝抗肿瘤作用的药理研究
 - 7 灵芝保护放化疗损伤的实验研究
 - 8 灵芝产品
- 参考文献
- 附录

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

章节摘录

版权页： 4.4.3薄芝糖肽注射液稳定肿瘤化疗患者血象 中、晚期恶性肿瘤患者78例随机分成两组。

观察组：40例肿瘤患者应用薄芝糖肽注射液（商品名：扶尔泰）联合化疗药治疗。

对照组：38例单纯化疗患者。

两组化疗用药基本相似。

由表4—7结果可见，观察组化疗前后白细胞（WBC）、红细胞（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板（PLT）均无明显变化；而对照组化疗前后WBC和其他外周血象均明显下降。

表4—8结果指出，观察组患者治疗后神疲、乏力，食欲下降，恶心、呕吐，腹胀、便秘等全身不适症状明显改善，生活质量明显提高。

可见薄芝糖肽注射液具有良好的稳定化疗患者血象，改善患者全身状况，提高患者生活质量的疗效（宋诸臣等，2006）。

4.4.4薄芝糖肽减轻宫颈癌患者同步放化疗血液毒性 本组28例宫颈癌患者均为2008年4月至2010年1月间，在医院实施手术，并于术后21天接受同步放化疗的患者，依照临床病理分型及相关理化检查提示：

期7例， 期13例， 期8例。

宫颈鳞状细胞癌21例，腺癌6例，小细胞未分化癌1例。

年龄在35～56岁之间，平均年龄为46.23岁。

28例患者依照就诊的时间顺序平均分为两组，每组14例，每组患者的年龄、病情分期、病理类型无明显差异，具有可比性。

对照组采用同步放化疗，放疗采用外照DT 40～44Gy / 20～22f，然后缩野行后程加速超分割治疗，每天2次，每次1.5Gy，间隔4～6小时，至总剂量DT 64～70Gy / 36～40f。

化疗方案为顺铂（DDP）20mg / m²，每周1次，共4周，同时根据患者的机体状况补充适当的能量、维生素。

观察组在对照组的治疗方案基础上加用薄芝（薄树芝）糖肽注射液4ml，溶入0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液250ml中，静脉滴注，每日1次，4周为1疗程。

疗效评价：外周血细胞检测采取专人采集、统一血球计数仪分析，分别记录治疗前、治疗中的每周数据及疗程结束后的数据，参照WHO血液毒性分级标准进行判断、统计，将放化疗后患者血液学毒性分为4级。

并观察临床症状（神疲、乏力、食欲减退、恶心、呕吐）及肝功能变化。

表4—9和表4—10结果指出，观察组治疗前后血象无明显变化。

此外，患者的生活质量明显提高，无因同步放化疗出现毒副作用。

对照组就存在显著性差异，血液学毒性 ~ 级10例，12例患者存在明显的神经、乏力、食欲减退、恶心、呕吐等症状及肝功能异常。

结果说明，薄芝糖肽能保护骨髓，减轻血液毒性，并有保肝作用（张迁，2011）。

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

编辑推荐

《灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤》对灵芝的中医药理论、现代医药学研究、灵芝在各类肿瘤治疗中的应用及抗肿瘤作用机制，以及民间应用灵芝治疗肿瘤的经验，都作了十分系统的阐述；对现有有关灵芝的市售产品也作了评介。

<<灵芝扶正祛邪辅助治疗肿瘤>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>