

<<护理学（中级）>>

图书基本信息

书名：<<护理学（中级）>>

13位ISBN编号：9787117166577

10位ISBN编号：7117166576

出版时间：2012-12

出版时间：人民卫生出版社

作者：全国卫生专业技术资格考试专家委员会 编

页数：1066

字数：2045000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<护理学（中级）>>

### 内容概要

为了帮助广大考生做好考前复习工作，全国卫生专业技术资格考试专家委员会特组织国内有关专家、教授编写了《2013全国卫生专业技术资格考试指导》护理学(中级)部分。本书根据最新考试大纲中的具体要求，参考国内外权威著作，将考试大纲中的各知识点与学科的系统性结合起来，以便于考生理解、记忆。

<<护理学（中级）>>

书籍目录

第一篇 内科护理学

第一章 呼吸系统疾病病人的护理

第一节 概述

第二节 急性呼吸道感染

第三节 慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿

第四节 支气管哮喘

第五节 慢性肺源性心脏病

第六节 支气管扩张症

第七节 肺炎

第八节 肺结核

第九节 肺脓肿

第十节 原发性支气管肺癌

第十一节 自发性气胸

第十二节 呼吸衰竭

第十三节 呼吸系统疾病病人常用诊疗技术及护理

第二章 循环系统疾病病人的护理

第一节 概述

第二节 心力衰竭

第三节 心律失常

第四节 心脏瓣膜病

第五节 冠状动脉粥样硬化性心脏病

第六节 心脏骤停

第七节 原发性高血压

第八节 病毒性心肌炎

第九节 循环系统疾病病人常用诊疗技术及护理

第三章 消化系统疾病病人的护理

.....

第二篇 外科护理学

第三篇 妇产科护理学

第四篇 儿科护理学

第五篇 社区护理学

第六篇 护理健康教育学

第七篇 医院感染护理学

第八篇 护理管理学

护理学专业（中级）考试大纲

## 章节摘录

版权页：4.胃液分析 胃溃疡病人胃酸分泌正常或稍低，十二指肠溃疡胃酸分泌过多。

一般仅在疑有促胃液素瘤时作鉴别诊断用。

5.大便隐血试验活动期消化性溃疡常有少量渗血，大便隐血试验呈阳性，但应注意排除假阳性。

四、治疗原则 治疗原则：消除病因，控制症状，促进愈合，预防复发和防治并发症。

(一)一般治疗 生活要有规律，工作宜劳逸结合，避免过度劳累和精神紧张，饮食原则是强调进餐要定时，避免辛辣、浓茶等刺激性食物和饮料，服用非甾体类药物者，应尽可能停用。

(二)药物治疗 治疗消化性溃疡的药物可分为两大类：抑制胃酸药物和保护胃黏膜药物。

1.抑制胃酸药物 (1)抗酸药：可直接中和胃酸，迅速缓解疼痛症状。

此药不宜单独使用，只作为治疗消化性溃疡的辅助用药。

常用药物有碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝等。

(2)H<sub>2</sub>受体拮抗剂：阻止组胺与H<sub>2</sub>受体结合，抑制胃酸分泌，该类价格便宜，临床上特别适用于根除幽门螺杆菌疗程完成后的后续治疗及半量作为长期维持治疗。

常用药物有西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁。

(3)质子泵抑制剂(H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-ATP酶抑制剂，PPI)：是目前已知的抑制胃酸分泌最强的药物，这类药物作用于壁细胞胃酸分泌终末过程的关键酶H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-ATP酶，使其失去活性，并不可逆转。

与H<sub>2</sub>受体拮抗剂相比PPI促进溃疡愈合的速度快、溃疡愈合率较高，因此，特别适合NSAID溃疡病人不能停用NSAID时或难治性溃疡的治疗，PPI是根除幽门螺杆菌基础药物。

常用奥美拉唑(洛赛克)、兰索拉唑、泮托拉唑。

DU病人疗程2~4周，Gu病人疗程4~6周。

2.保护胃黏膜药物 (1)硫糖铝：作用机制是硫糖铝可粘附在溃疡表面阻止胃酸/胃蛋白酶的侵袭、促进内源性前列腺素合成和刺激表皮生长因子分泌。

(2)枸橼酸铋钾(CBS)：除有硫糖铝的作用机制外，并有较强抑制幽门螺杆菌作用。

疗程4~8周。

(3)前列腺素类药物：具有抑制胃酸分泌，增加胃十二指肠黏膜的黏液和碳酸氢盐的分泌，增加黏膜的血流作用。

代表药物为米索前列醇。

(三)根除幽门螺杆菌 临床上常采用联合用药的方法。

目前，常以PPI或胶体铋剂为基础加上两种抗生素的三联疗法。

抗生素通常选用克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑中的两种。

疗程7天。

五、护理措施 1.休息 轻症者适当休息，可参加轻微工作，注意劳逸结合，避免过度劳累，溃疡处于活动期、大便隐血试验阳性病人应卧床休息1~2周。

2.饮食护理 宜选用营养丰富、清淡、易消化的食物，以利促进胃黏膜修复和提高抵抗力。

急性活动期应少食多餐，每天5~6餐，以牛奶、稀饭、面条等偏碱性食物为宜。

少食多餐可中和胃酸，减少胃的饥饿性蠕动，同时可避免过饱所引起的胃窦部扩张增加促胃液素的分泌。

忌食辛辣、过冷、油炸、浓茶等刺激性食物及饮料。

戒烟酒。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>