

<<急诊科用药>>

图书基本信息

书名：<<急诊科用药>>

13位ISBN编号：9787506744768

10位ISBN编号：7506744767

出版时间：2010-6

出版时间：中国医药科技出版社

作者：刘皈阳 编

页数：500

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<急诊科用药>>

### 前言

急诊医学是现代医学科学的重要组成部分，是一门具有明显的新兴性、交叉性和边缘性的学科。随着我国社会经济的迅速发展，社会对急诊医疗服务提出了更高的要求。急症涉及到各临床科室，范围广，且各科急症之间、各系统疾病之间有着密切的联系。在急症的抢救、处理中，需要手术的要抓紧时机进行手术治疗；非手术急症则需要立即给予有效的药物治疗，力争尽快地缓解病情。根据患者的具体病情，选择合理、有效的药物，是急症抢救成功的关键；否则，会延误病情，后果不堪设想。

为此，我们编写了这本《急诊科用药》，可作为医务人员在医疗过程中的参考书，亦可作为医药院校学生学习参考之用。

## <<急诊科用药>>

### 内容概要

本书为简明临床用药口袋丛书之一，全书共分9章，介绍急诊科临床常用药物，包括心脏急症、呼吸系统急症、消化系统急症、泌尿系统急症、内分泌系统急症、血液系统急症、神经系统急症、皮肤急症用药及中毒解救药物。

内容实用，切中临床，携带方便。

可供临床医生查阅，也可作为医药院校学生的参考书。

<<急诊科用药>>

书籍目录

第一章 心脏急症第二章 呼吸系统急症第三章 消化系统急症第四章 泌尿系统急症第五章 内分泌系统急症第六章 血液系统急症第七章 神经系统急症第八章 皮肤急症第九章 中毒解救药物索引

## &lt;&lt;急诊科用药&gt;&gt;

## 章节摘录

他各种精神病性状态的明显的阳性症状（如：幻觉、妄想、思维紊乱、敌视、怀疑）和明显的阴性症状（如：反应迟钝、情绪淡漠及社交淡漠、少语）。

也可减轻与精神分裂症有关的情感症状（如：抑郁、负罪感、焦虑）。

对于急性期治疗有效的患者，在维持期治疗中，本品可继续发挥其临床疗效。

【用法用量】起始剂量为一次1mg，一日2次；第2日增加至一次2mg，一日2次；如能耐受，第3日可增加至一次3mg，一日2次。

此后，可维持此剂量不变，或根据个人情况进一步调整。

剂量调整应缓慢，调整的间隔时间一般不少于1周，推荐增减剂量幅度为1~2mg。

由于对日剂量大于16mg的安全性尚未评价，每日用药剂量不应超过16mg。

肌内注射治疗精神分裂症：一次25mg，每2周1次。

某些患者可能需要更高的剂量，如37.5mg或50mg。

不推荐剂量高于每2周50mg。

在首次注射微球后3周的延迟期内，应补充口服抗精神病药物治疗。

剂量上调的频率不得超过每4周1次。

在首次采用调整后的较高剂量注射后的3周之内，无法预测剂量调节的效果。

<<急诊科用药>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>