

<<常见皮肤病诊疗手册>>

图书基本信息

书名：<<常见皮肤病诊疗手册>>

13位ISBN编号：9787508272887

10位ISBN编号：7508272889

出版时间：2012-6

出版时间：金盾出版社

作者：赵广 编

页数：300

字数：244000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<常见皮肤病诊疗手册>>

### 内容概要

《常见皮肤病诊疗手册》由空军总医院皮肤科赵广教授主编，详细介绍了常见、多发性皮肤病的病因、临床特点、诊断、治疗方法和预防措施。

为便于初学者和基层医生掌握诊断与鉴别诊断知识，《常见皮肤病诊疗手册》对每个病种的临床特征做了详细描述，并配有彩色照片。

其内容丰富，科学实用，是基层医生不可缺少的参考书，也可供皮肤科医生临床参考使用。

## <<常见皮肤病诊疗手册>>

### 作者简介

赵广  
中国人民解放军全军皮肤病研究所、空军总医院皮肤科主任医师、教授、博士研究生导师。  
任中华医学会皮肤科分会委员，治疗学组副组长，中华北京市皮肤科学会副主任委员；中国中西医结合皮肤科学会常委，色素病研究会副主任委员；中国医师学会皮肤科分会常委；北京市中医皮肤科学会副主任委员；全军中医药学会主任委员。  
中华皮肤科杂志、中国皮肤病性病杂志、北京医学和实用皮肤病杂志编委。

长期从事皮肤病的临床医疗、教学、科研工作，有丰富的临床工作经验和科研、教学能力。  
编著和参加编写著作有《临床皮肤病性病彩色图谱》、《系统疾病与皮肤病》、《色素性皮肤病》、《皮肤科疑难病例诊断》、《临床皮肤病学》、《常见皮肤病的防治》等。  
发表论文50余篇。

<<常见皮肤病诊疗手册>>

书籍目录

- 第一章 概述
- 第二章 病毒感染性皮肤病
- 第三章 细菌感染性皮肤病
- 第四章 真菌感染性皮肤病
- 第五章 性传播疾病
- 第六章 动物所致皮肤病
- 第七章 物理及机械性皮肤病
- 第八章 变应性及瘙痒性皮肤病
- 第九章 斑丘疹和鳞屑性皮肤病
- 第十章 水疱性皮肤病
- 第十一章 结缔组织病
- 第十二章 血管性皮肤病
- 第十三章 遗传性皮肤病
- 第十四章 色素障碍性皮肤病
- 第十五章 红斑和角化性皮肤病
- 第十六章 皮肤附属器疾病
- 第十七章 皮肤肿瘤

## &lt;&lt;常见皮肤病诊疗手册&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：（1）蜂毒对人体的主要损害 蜂毒直接作用及继发损害。

造成中枢及周围神经损伤、头痛、头晕、昏迷、衰竭、麻木等，血管内溶血，弥散性血管内凝血，横纹肌溶解，多脏器损伤，如肝衰竭、肾衰竭、心力衰竭、肺水肿、脑水肿。

横纹肌溶解致急性肾损伤，细胞损害炎症递质释放致全身炎症反应综合征，继发性感染等。

蜂毒致变态反应。

有关变态反应的机制尚不清楚，可出现荨麻疹、血管神经性水肿、喉头水肿、肺水肿、过敏性休克、血清病样反应及肾损害、发热、皮疹、关节病、淋巴结肿大等临床表现。

（2）蜂蜇伤致死的原因 溶血毒素引起溶血及肌溶解致急性肾衰竭。

神经毒素致脑水肿，中毒性脑病。

蜂毒引起喉头水肿、肺水肿、过敏性休克。

群蜂蜇伤致严重多脏器损伤及衰竭。

大面积创面感染致败血症。

【临床特点】 人被少数蜂蜇后，局部即感灼痛或刺痛，很快出现红肿或风团，被蜇处中央常有一小瘀点，甚至可出现水疱，一般无全身症状，皮疹可在数小时内消失。

若被多数蜂蜇某一部位，可引起大片肿胀，甚至坏死。

重者可出现全身症状，对蜂毒过敏时可出现皮肤荨麻疹，鼻通气不畅，口唇及眼睑肿胀，喉痒水肿、呼吸困难、心率增加、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

严重者血压下降，发生过敏性休克，容易导致循环、呼吸衰竭。

另有部分中毒者出现发热、全身疼痛、头痛、躁动不安、肌肉痉挛。

黄蜂蜇伤可能发生溶血，出现血红蛋白尿，严重者肾衰竭。

伴有肝脏损害者可有黄疸和肝功能异常。

中枢神经系统和周围神经系统发生脱髓鞘病变者则出现肌肉无力，或者周围神经炎表现。

如果被大量蜂蜇在头面重要部位，尤其是直接刺入血管内或多处同时受蜇时，可引起中毒、休克、抽搐、昏迷、心力衰竭、哮喘、呼吸困难等严重全身症状，甚至导致死亡。

【诊断与鉴别诊断】 根据有蜂蜇史，局部疼痛及明显的肿胀症状，一般不难诊断，要与其他虫咬皮炎相鉴别。

【治疗】 治疗原则为尽快处理伤口，吸出毒汁，治疗变态反应，重者防治休克。

要注意保持呼吸畅通，给氧并补充血液灌注，若有呼吸或心脏骤停则进行人工呼吸、心脏按压等急救处理。

（1）局部治疗 蜂蜇后应立即检查有无遗留蜂针，如有应先用碘酊消毒后小心拔除，然后用力掐住被蜇伤的部分，用嘴反复吸吮，吸出毒液后用清水、肥皂水或1：5 000高锰酸钾溶液冲洗。

轻者，局部外用药可选择：5%碳酸氢钠溶液、10%氨水、碘酊、风油精、氟轻松等糖皮质激素类软膏或霜。

肿胀明显者可选用：5%碳酸氢钠溶液；1：20复方醋酸铅溶液冷湿敷；放置冰袋。

局部疼痛明显者，可选用2%普鲁卡因溶液2—3ml；1%盐酸依米丁（吐根碱）溶液3ml（也可用生理盐水稀释5~10倍）；3%盐酸麻黄碱溶液0.5~1ml在蜇伤处皮下注射，可很快止痛消肿；10%葡萄糖酸钙10ml，缓慢静脉注射，可解除局部肌肉痉挛；蛇药6~8片研碎，温水10ml化开，搅拌为糊，涂搽患部，每日10余次，直至消肿、止痛。

<<常见皮肤病诊疗手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>