

<<生活应急救治妙法>>

图书基本信息

书名：<<生活应急救治妙法>>

13位ISBN编号：9787509110171

10位ISBN编号：7509110173

出版时间：2007-7

出版时间：人民军医出版社

作者：郑霄阳

页数：208

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<生活应急救治妙法>>

内容概要

《生活应急救治妙法（第2版）》作者立足生活实际，详细介绍了日常生活中可能遇到的意外伤害、急危病症的应急处理和简易救治方法。包括生命体征观测，常用急救技术，常见危急重症、意外创伤、急性中毒急救，意外灾难和动物咬伤应急处理，以及儿童意外伤害防范等。

内容科学实用，阐述简明易懂，对普及现场急救知识、提高自救互救能力具有很好的指导价值。适于城乡广大群众和基层医务人员阅读参考。

<<生活急救治妙法>>

书籍目录

一、生命体征观测法意识呼吸脉搏血压体温瞳孔二、常用急救技术与技巧人工呼吸术心脏按摩双人心肺复苏术儿童心肺复苏术输氧法止血法包扎术骨折固定术洗胃术搬运伤病员法单独搬运伤病员法两人搬运伤病员法三、常见急危重症的急救休克昏迷高热晕厥眩晕晕船(车)癫痫卒中中暑澡堂虚脱(晕汤)头痛心绞痛心肌梗死牙痛鼻出血咯血哮喘呼吸困难突然声哑腹痛癌症疼痛呕血呕吐打嗝腹泻便秘尿潴留新婚性交后出血房事昏厥包皮嵌顿避孕套过敏怀孕早期阴道流血妊娠晚期腹痛与阴道流血、流水紧急分娩小儿高热惊厥小儿吐奶褥疮四、常见意外创伤的急救外伤骨折肢体断离头部受暴力打击头皮裂伤头皮撕脱伤头皮血肿眼部挫伤眼球贯通伤电焊光伤眼农药入眼鼓膜外伤颞下颌关节脱位(掉下巴)骨刺卡喉手切割伤刺伤玻璃屑嵌进肉里阴囊外伤腰部扭伤脚踝扭伤脚底被刺伤勒缢五、常见中毒的急救食物中毒河鲀鱼中毒发芽马铃薯中毒四季豆中毒苦杏仁中毒棉籽油中毒霉变甘蔗中毒有毒蜂蜜中毒蓖麻子中毒桐油中毒白果中毒人参中毒毒蕈中毒酒精中毒甲醇中毒碘酒中毒磷化锌中毒砒霜中毒盐卤中毒蟾蜍中毒氰化物中毒催眠药中毒有机磷农药中毒煤气中毒沼气中毒地窖窒息汽油中毒沥青中毒六、常见意外灾难的应急处理遇到灾难天灾人祸火灾烟雾袭击急救火电器失火身上衣服着火家中失火油锅起火烧伤皮肤烫伤咽部烫灼伤电击伤雷击伤溺水游泳时抽筋掉进冰窟窿同伴掉入冰水中森林大火台风袭击陷进沼泽帐篷遭受侵袭登山遇寒野外求救风雨中迷路雪天迷路白昼迷路黑夜迷路沙漠中缺水车祸两车相撞地铁意外事故沉船事故水中遇到鲨鱼遇到劫机空难事故水灾塌方掩埋高处跌下地震洞穴遇险雪洞藏身滑雪意外滑雪板掉了雪盲冻伤困在电梯内购物时被窃遇到打劫驾车时受到暴徒攻击七、动物咬伤的应急处理狗咬伤猫咬伤毒蛇咬伤有毒蛇与无毒蛇的区别蜈蚣咬伤蝎子蜇伤蚂蟥咬伤蜂蜇伤毒蜘蛛咬伤毛毛虫蜇伤蜂蜇伤吸血蝇咬伤海蜇蜇伤甲鱼咬住不放鼠咬伤大动物咬伤牛角顶伤牲畜踢伤八、儿童意外伤害的防范保护眼睛防外伤眼睛钝挫伤眼眉部受伤预防眼睛外伤儿童切割伤表浅切割伤深大切割伤预防切割伤戳伤铁钉扎伤咽部、气管异物喉部异物气管异物晕针上学和放学途中意外伤害的预防下课时意外伤害的预防实践课意外伤害的预防体育课意外伤害的预防骑自行车意外预防在家中伤害的预防玩具伤害的预防附录A 怎样正确拨打“120”呼救电话附录B 急救常用穴位

<<生活急救治妙法>>

章节摘录

一、生命体征观测法 意识 意识是指人对周围环境和自身的识别能力及清晰程度，是大脑功能活动的综合表现。

正常人的意识清晰，对答正确，能够正确地识别时间、地点和人物，能对环境的刺激作出相应的反应。

而许多危重的疾病，如严重感染、肝性脑病、酒精中毒、卒中、脑外伤等，往往会影响大脑的功能活动，从而引起程度不同的意识障碍。

通过观察患者的意识状态，可以判断病情的严重程度，以便采取合适的对症处理。

意识障碍在临床上可有下列几种表现： 1.意识模糊 这是较轻度的意识障碍，患者表情淡漠，对自己及周围环境漠不关心，回答问题迟缓而简短，但仍合理。

2.谵妄 这是一种较意识模糊稍重的意识障碍，除意识模糊外，还常伴有错觉、幻觉，有躁动不安、言语杂乱（说胡话），甚至有发狂等精神异常的表现。

患者对人物、地点、时间的定向力可丧失。

3.昏睡 患者处于熟睡状态，不易唤醒。即使强行弄醒，又会很快入睡。

唤醒时，患者能睁眼看人但缺乏表情，回答问题言语含糊不清，甚至答非所问，定向力也可丧失。

4.昏迷 这是严重的意识障碍，意识完全丧失。

呼唤及强烈刺激时，患者也不能清醒。

昏迷是最严重的意识障碍，其严重程度可分为如下3种： （1）浅昏迷：患者无随意运动，处于被动体位。

对周围事物及声、光刺激均无反应，但以强烈刺激如压迫眶上孔或针刺足底时尚有反应（前者可表现为痛苦表情或呻吟；后者可有防御反射性屈曲或躲避运动）。

呼吸、脉搏、血压无明显变化，但大小便可有潴留或失禁。

（2）深昏迷：患者肌肉松弛，对各种刺激均无反应。

吞咽反射、咳嗽反射、角膜反射及瞳孔反射均消失。

大小便失禁或潴留。

机体仅能维持最基本的生命活动。

（3）中度昏迷：介于浅昏迷与深昏迷之间，患者对强烈刺激稍有反应，角膜反射减弱，瞳孔L反射迟钝。

意识障碍的程度极不稳定，病情在不断变化。

.....

<<生活急救治妙法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>