

<<袖珍药物手册>>

图书基本信息

书名：<<袖珍药物手册>>

13位ISBN编号：9787509131312

10位ISBN编号：7509131316

出版时间：2010-1

出版时间：人民军医出版社

作者：芮耀诚 编

页数：882

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<袖珍药物手册>>

前言

前一版《袖珍药物手册》以药物品种较齐全、内容丰富、形式精练、篇幅较小、实用性强为特点，受到广大读者的欢迎。

自2005年8月出版以来，已3次印刷。

4年来随着医药科技的高速发展，国内外新药层出不穷，临床中作用不确切或不良反应严重的药物被淘汰，为适应我国医药事业发展的需要，我们在第1版的基础上，对相关药物加以补充与更新，以便更好地为医药工作者提供最新信息。

本版《袖珍药物手册》仍以药理作用及其临床应用分类编排，包括临床常用品种及新上市和进口的新药。

每一药物均按中英文正名、别名、作用与临床应用、不良反应与注意事项、用法与用量、制剂等分项叙述。

为便于查阅，本书在目录部分列有详细的药品名称，书末附有中英文药名索引。

限于篇幅，本书取材多限于贴近临床实际应用的概要内容，如若读者在某些方面需进一步了解，请参阅大型药物学或有关专著。

本书中介绍的药物用法与用量为一般推荐的参考用法和用量范围，在临床实际应用时请查对该药品的说明书，以其中记载为准。

<<袖珍药物手册>>

内容概要

编者收载了常用药及新药数千种，分别介绍了各种药物的通用名及别名、作用与临床应用、不良反应与注意事项、用法与用量、制剂等。

《袖珍药物手册(第2版)》编写简洁明晰，实用性强，查阅方便，适于广大临床医师、药师、医药院校师生参考阅读。

<<袖珍药物手册>>

书籍目录

第1章 全身麻醉药第2章 局部麻醉药第3章 骨骼肌松弛药第4章 镇静催眠药第5章 抗癫痫药及抗惊厥药
第6章 抗精神失常药第7章 抗帕金森病药第8章 抗老年痴呆药第9章 镇痛药第10章 解热镇痛抗炎及抗痛
风药第11章 中枢兴奋药第12章 拟胆碱药第13章 抗胆碱药第14章 拟肾上腺素药第15章 抗肾上腺素药
第16章 抗高血压药第17章 抗心绞痛药第18章 抗脑缺血药第19章 调血脂及抗动脉粥样硬化药第20章 抗
慢性心功能不全药第21章 抗心律失常药第22章 主要作用于泌尿系统的药物第23章 调节水、电解质及酸
碱平衡第24章 主要作用于血液和造血系统的药物第25章 消化系统药第26章 呼吸系统药物第27章 抗组胺
药第28章 肾上腺皮质激素类药物第29章 性激素类药物及避孕药第30章 甲状腺激素及抗甲状腺药第31章
甲状旁腺素和降钙素第32章 胰岛素及口服降糖药第33章 抗骨质疏松药第34章 维生素第35章 微量元素
第36章 营养用药第37章 抗生素第38章 磺胺类、喹诺酮及其他合成抗菌药第39章 抗真菌药第40章 抗结
核药物第41章 抗麻风病药第42章 抗病毒药第43章 抗疟药第44章 抗阿米巴病药及抗滴虫药第45章 抗血
吸虫病药和抗丝虫病药第46章 驱肠虫药第47章 抗恶性肿瘤药第48章 免疫调节药第49章 皮肤科用药
第50章 眼科用药第51章 耳鼻咽喉科用药第52章 口腔科用药第53章 特殊解毒药第54章 酶类及生物制品
第55章 诊断用药药名中文索引药名英文索引

<<袖珍药物手册>>

章节摘录

【作用与临床应用】作用于大脑和脊髓运动中枢的肌肉松弛药，尚有外周抗胆碱和抗组胺作用。用作解除局部肌肉痉挛性疼痛的辅助用药。

【不良反应与注意事项】常见视物模糊、口干和皮肤干燥，轻度兴奋。

禁用于闭角型青光眼及重症肌无力患者。

心动过速、心功能不全或尿潴留患者慎用。

服药期间避免驾驶等注意力高度集中的活动。

【用法与用量】口服，每次100mg，2 / d。

肌肉注射或静脉注射，每次60mg，2 / d。

【制剂】片剂：100mg。

注射剂：60mg / 2ml，300mg / 10ml。

A型肉毒毒素（衡力）Botulinum toxin A（BTXA）【作用与临床应用】本品抑制周围运动神经末梢突触前膜乙酰胆碱释放，引起肌肉松弛性麻痹。

用于眼睑痉挛、面肌痉挛等成人患者及某些斜视，特别是急性麻痹性斜视、共同性斜视、内分泌肌病引起的斜视及无法手矫正或手术效果不佳的12岁以上的斜视患者。

【不良反应与注意事项】可出现短暂的眼睑下垂、下睑后退、瞬目减少、睑裂闭合不全、面肌肌力减弱等。

有发热、急性传染病者，有心、肝、肺疾病，活动性结核，血液病者及孕妇和12岁以下儿童慎用。

注射后应留院内短期观察。

氨基糖苷类抗生素具有神经肌肉阻滞作用的药物能加强本品的作用。

【用法与用量】肌内多点注射法。

每点起始量为2.5U，注射1周后有残存痉挛者可追加注射；病情复发者可做原量或加倍量（5U）注射。

但单次注射总剂量不应高于55U，1个月内使用总剂量应不高于200U。

对病情出现反复者可做不定期的增量或维持量注射。

每次每条肌肉最大用量应不高于5U。

<<袖珍药物手册>>

编辑推荐

《袖珍药物手册(第2版)》由人民军医出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>