

<<实用西医师中成药手册肿瘤科分册>>

图书基本信息

书名：<<实用西医师中成药手册肿瘤科分册>>

13位ISBN编号：9787513211499

10位ISBN编号：7513211493

出版时间：2012-11

出版时间：中国中医药出版社

作者：李忠 编

页数：364

字数：287000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用西医师中成药手册肿瘤科分册>>

内容概要

《实用西医师中成药手册：肿瘤科分册》参考《中华人民共和国药典》（简称《中国药典》）和其他相关资料，收集整理了肿瘤临床常用的中成药，目的在于为从事肿瘤临床的医师提供一本较实用的中成药临床参考书，推动中成药在肿瘤临床治疗中的规范使用，提高临床疗效。

书籍目录

第一章 概论

第一节 中医治疗肿瘤的发展现状及研究成果

- 一、肿瘤病名的研究
 - 二、肿瘤发病机理的研究
 - 三、肿瘤中医诊断研究
 - 四、肿瘤中医治法研究
 - 五、抗肿瘤中药的筛选研究
 - 六、抗肿瘤中药作用机理研究
 - 七、抗肿瘤中药的药理分类研究
 - 八、抗肿瘤中药制剂的研究
 - 九、中医治疗肿瘤临床规范化与疗效标准的研究
- 第二节 中医治疗肿瘤临床优势、特色与治疗效果

- 一、中医治疗肿瘤的优势、特色
- 二、中医治疗肿瘤的临床效果

第三节 中医治疗肿瘤临床辨证的原则

- 一、整体与局部辨证相结合
- 二、辨病与辨证相结合
- 三、辨标本缓急

第四节 中成药在肿瘤治疗中的应用

- 一、中成药临床分类方法
- 二、中成药临床应用方法
- 三、抗肿瘤中成药临床应用特点
- 四、中成药现代研究现状与发展思路

第五节 抗肿瘤中成药的服用禁忌

- 一、正确认识中成药的毒副作用
- 二、关于“国药准字”号药品
- 三、中成药之间的配伍禁忌
- 四、中西药之间的配伍禁忌

第二章 肿瘤相关中成药

第一节 扶助正气类

八珍丸

百合固金丸

百令胶囊

博尔宁胶囊

补中益气丸

扶正女贞素片

川黄口服液

槐耳颗粒

健脾益肾颗粒

金菌灵胶囊

金水宝胶囊

康逆胶囊

灵芝胶囊

灵芝片

灵芝糖浆

六味地黄丸

芦笋胶囊

螺旋藻胶囊

芪珍胶囊

强力康颗粒

.....

第三章 中成药临床应用方案

附录 方剂索引

章节摘录

(3) 心功能不全患者的用药禁忌：老年肿瘤患者及应用葱环类药物的肿瘤患者常常合并心功能不全的情况。

洋地黄类及硝酸酯类药物是治疗心功能不全的常用药物，但该类物质与许多中药合并应用都会产生严重的毒副作用，临床中应格外注意：洋地黄类药物不宜与含钙类中药联合应用：珍珠母、龙骨、牡蛎以及石决明、石膏、寒水石、虎骨、瓦楞子、蛤壳、龙齿、海螵蛸等中药，含有大量的钙离子，对神经有抑制作用，并能减低血管通透性。

当含钙的中药与洋地黄类药物合用时，能增加强心苷的作用，使之毒性增强，并可引起心律失常和传导阻滞。

同时，由于钙能加强强心苷的作用及毒性，故加用钙剂容易引起强心苷中毒，对洋地黄化的病人尤甚。

因此，凡含钙离子的中药及其复方制剂，不宜与洋地黄类强心苷同时服用。

洋地黄类药物不宜与含有麻黄的中成药并用：通宣理肺丸、麻杏止咳片、麻杏石甘汤等制剂均含有麻黄，而中药麻黄中的主要成分为麻黄碱，能兴奋心肌，使心肌收缩力加强。

当含麻黄的中药制剂与洋地黄类强心苷同服时，能加强强心苷的作用。

但麻黄碱除了能加强地高辛的治疗作用外，还能增强地高辛对心脏的毒性，引起心律失常。

因此麻黄及其制剂与强心苷类不可合用，尤其对洋地黄化病人更当禁忌。

洋地黄类药物不宜与含枳实的方剂同用：大承气汤、枳实导滞丸等方剂中的枳实，含有对羟福林、N-甲基酪胺等成分，具有兴奋受体和受体的作用，可增强心肌的收缩力，并升高血压，能增强洋地黄类强心苷的作用，同时增加其毒性，引起心律失常等反应。

因此凡含枳实的各种复方制剂，不宜与洋地黄类强心苷同时服用。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>