

<<果树农药使用手册>>

图书基本信息

书名：<<果树农药使用手册>>

13位ISBN编号：9787535244734

10位ISBN编号：7535244734

出版时间：1970-1

出版时间：湖北科技

作者：罗汉钢//刘元明

页数：235

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<果树农药使用手册>>

内容概要

《常用新农药实用技术丛书》以农作物病、虫、草、鼠害农药防治为主线，共有《水稻农药使用手册》、《旱粮作物农药使用手册》、《棉油茶农药使用手册》、《蔬菜农药使用手册》、《果树农药使用手册》、《观赏植物农药使用手册》6个分册，介绍了农作物主要有害生物发生规律、特点、识别方法，使用的新农药名称、剂型、防治适期、使用方法、注意事项和中毒急救。

<<果树农药使用手册>>

书籍目录

柑橘病虫害 一、柑橘病害 (一)黄龙病 (二)溃疡病 (三)煤烟病 (四)疮痂病 (五)炭疽病 (六)脂点黄斑病 (七)油斑病 (八)脚腐病 (九)裂皮病 (十)贮藏期病害 二、柑橘虫害 (一)红蜘蛛 (二)锈壁虱 (三)粉虱 (四)蚧类 (五)潜叶蛾 (六)花蕾蛆 (七)星天牛 (八)吉丁虫类 (九)恶性叶甲 (十)橘蚜 (十一)金龟子 (十二)吸果夜蛾 (十三)大实蝇 (十四)橘小实蝇 三、柑橘园常用农药 (一)柑橘园常用杀菌剂 (二)柑橘园常用杀虫剂 (三)柑橘园常用杀螨剂 (四)柑橘园常用除草剂 梨病虫害 一、梨病害 (一)黑斑病 (二)黑星病 (三)轮纹病 (四)梨炭疽病 (五)梨锈病 (六)褐斑病 (七)梨白纹羽病 二、梨虫害 (一)梨二叉蚜 (二)梨茎蜂 (三)梨小食心虫 (四)山楂红蜘蛛 (五)梨网蝽 (六)梨瘿蚊 (七)中国梨木虱 (八)梨叶瘿螨 桃病虫害 一、桃病害 (一)桃流胶病 (二)桃冠腐病 (三)桃褐腐病 (四)桃真菌性叶片穿孔病 二、桃虫害 (一)桃潜叶蛾 (二)桃蚜 (三)桑白蚧壳虫 (四)桃红颈天牛 (五)桃蛀螟 (六)桃小食心虫 (七)梨小实心虫 李病虫害 一、李病害 (一)李红点病 (二)李炭疽病 二、李虫害 (一)李实蜂 (二)李小食心虫 葡萄病虫害 一、葡萄病害 (一)葡萄霜霉病 (二)葡萄黑痘病 (三)葡萄白粉病 (四)葡萄白腐病 (五)葡萄褐斑病 (六)葡萄炭疽病 (七)葡萄房枯病 (八)葡萄黑腐病 (九)葡萄根癌病 二、葡萄虫害 (一)葡萄透翅蛾 (二)葡萄短须螨 (三)葡萄缺节瘿螨 (四)葡萄粉蚧 柿病虫害 一、柿病害 (一)柿角斑病 (二)柿圆斑病 (三)柿炭疽病 (四)柿叶枯病 (五)柿黑星病 板栗病虫害 猕猴桃病虫害 枣病虫害

<<果树农药使用手册>>

章节摘录

(五)炭疽病 1.发生规律该病病菌是一种弱寄生菌,具有潜伏侵染性,病菌在病枝、叶、果上越冬,在柑橘整个生长季节中均可受害,高温高湿条件下最易引起该病的发生和流行,发病的最适温度为21-28℃,故夏梢、秋梢发病较重。

2.特点和识别方法为害叶片有两种症状类型:急性型(叶枯型)症状常从叶尖开始,初为暗绿色,像被开水烫过的样子,病部、健部边缘处很不明显,后变为淡黄色或黄褐色,叶卷曲,叶片很快脱落。

此病从开始到叶片脱落时间为3~5天。

叶片已脱落的枝梢很快枯死,并且在病梢上产生许多朱红色而带黏性液点。

慢性型(叶斑型)症状多出现在成长叶片或老叶的叶尖或近叶缘处,圆形或近圆形,稍凹陷,病斑初为黄褐色,后期灰白色,边缘褐色或深褐色。

病部、健部分界明显。

在天气潮湿时,病斑上出现许多朱红色而带黏性的小液点,在干燥条件下,病斑上出现黑色小粒点,散生或呈轮纹状排列。

病叶脱落较慢。

枝梢受害后也有两种症状,一种是由梢顶向下枯死,多发生在受过伤的枝梢。

初期病部褐色,以后逐渐扩展,终致病梢枯死。

枯死部位呈灰白色,病部、健部组织分界明显,病部上有许多黑色小粒点。

另一种是发生在枝梢中部,从叶柄基部腋芽处或受伤皮层处开始发病,初为淡褐色,椭圆形,后扩展成梭形,稍凹陷,当病斑环割枝梢一周时,其上部枝梢很快全部干枯死亡。

<<果树农药使用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>