

<<不孕不育夫妇必读>>

图书基本信息

书名：<<不孕不育夫妇必读>>

13位ISBN编号：9787535760234

10位ISBN编号：7535760236

出版时间：2010-4

出版时间：湖南科技出版社

作者：廖善祥，王大可 编著

页数：128

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<不孕不育夫妇必读>>

前言

不孕症是世界性的健康问题，也是生殖健康中的一个重要问题。夫妻俩因不孕或不育，身心受到严重的伤害，造成夫妻感情不和，有些夫妻甚至因此感情破裂，婚姻解体。

对于这些兄弟姐妹，我们十分同情，心里也很难过。

《论语·雍也》云：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”

杨伯峻先生译得好：“（对于任何学问和事业）懂得它的人，不如喜欢它的人，喜欢它的人不如以它为乐的人。”

意思是“以它为乐”和“喜欢它”，这是“懂得它”的前提。

这说明我们这些知道一些不孕或不育知识的人，只有喜欢这门学科，才能在科学的天地里享受快乐；当你喜欢这门学科，并从中找到无穷的乐趣时，会更激励你努力学习，深入钻研和真正懂得这一学科。

我们对于“不孕”和“不育”这门学科，“懂得它”、“喜欢它”和“以它为乐”还不够，还有更重要的任务，就是使非专业人员“喜欢它”和“以它为乐”；还要使不孕或不育的兄弟姐妹“懂得它”、“喜欢它”和“以它为乐”，这个提高和普及的任务非常艰巨。

从医40余年，我勤学苦练，刻苦钻研，不断充实和提高自己，虽离“学富五车”还相差甚远，但我愿把点滴积累的知识和实践经验写出来，于是编写了这本《不孕不育夫妇必读》，献给不孕不育的夫妇，同时也可作为医务工作者进行临床实践的参考书，以指导不孕症夫妇的诊断和治疗。

我希望许许多多不孕症夫妇读了这本书之后，心情开朗，有信心和决心治疗好不孕症，而不要心灰意冷，悲观失望。

要知道“车到山前必有路，柳暗花明又一村”。

<<不孕不育夫妇必读>>

内容概要

希望许许多多不孕不育夫妇读了这本书后，心情开朗，有信心和决心治疗好不孕不育症，不要心灰意冷，悲观失望。

要知道“车到山前必有路，柳暗花明又一村”。

愿天下所有不孕不育夫妇都有一个健康活泼、聪慧大器的小宝宝！

<<不孕不育夫妇必读>>

作者简介

廖善祥，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。
原湖南省计划生育研究所所长、书记，组建现代优生技术湖南省重点实验室并任主任。

廖善祥长期从事妇产科、遗传优生、计划生育等临床及科研工作。
从医40多年积累了丰富的临床经验，尤以中西医结合治疗不孕不育，生殖道炎症，女性月经不调，男性少精、弱精、畸形精子症、性功能障碍、遗传病诊治等为突出。
曾获湖南省科技进步三等奖1个，省厅级科技进步奖4个。
主编专著6部，发表论文42篇，科普文章49篇。
现虽古稀之年，仍在为广大求医者解除病痛，工作在临床第一线。

<<不孕不育夫妇必读>>

书籍目录

- 第一章 不孕症的概况 001 什么叫不孕症？
002 为什么说不孕症是世界性的健康问题？
003 女性受孕必须具备哪些条件？
004 男性生育应具备哪些条件？
005 哪些女性患者应到不孕症门诊看病？
006 哪些男性患者应到不育症门诊看病？
- 第二章 不孕症的病因女性不孕症的病因与疾病的临床表现 007 子宫性闭经是由什么原因引起的？
008 卵巢性闭经是由哪些原因引起的？
009 垂体性闭经由哪些原因引起？
010 下丘脑(中枢)性闭经由哪些原因引起？
011 先天性卵巢发育不全有哪些表现？
012 多囊卵巢综合征有哪些表现？
013 卵巢功能早衰有哪些表现？
014 子宫内膜异位症有哪些表现？
015 男性化卵巢肿瘤有哪些表现？
016 性腺轴功能紊乱有哪些表现？
017 垂体肿瘤临床有什么表现？
018 染色体畸变能引起闭经和无排卵吗？
019 基因突变会引起闭经和无排卵吗？
020 睾丸女性化患者为何闭经？
021 甲状腺分泌异常可引起闭经和无排卵吗？
022 肝、肾功能异常可引起闭经和无排卵吗？
023 为什么过度紧张、恐惧也会引起闭经和无排卵？
024 为什么会出现闭经溢乳综合征？
025 柯孟(Kallman)综合征有什么表现？
026 导致不孕的输卵管因素有哪些？
027 输卵管发育异常的表现有哪些？
028 输卵管炎症有哪些表现？
029 导致不孕的子宫因素有哪些？
.....第三章 不孕症的检查第四章 不孕症的治疗第五章 辅助生殖技术第六章 不孕症夫妇孕产须知

<<不孕不育夫妇必读>>

章节摘录

插图：什么原因可使精子运行受阻？

(1) 附睾及输精管结核可使输精管阻塞，阻碍精子的通过；泌尿系统结核，可引起生殖系统的结核，附睾结核同时合并生殖系其他部位的结核。

附睾结核的特征为结核性肉芽肿，干酪样变和纤维化，附睾增厚，从附睾尾部及头部波及。

国内有输精管结核的报道，输精管结核的特点为输精管增粗，呈串珠样。

由于附睾管和输精管阻塞，精子无法通过，导致不育。

(2) 阳痿和早泄常常不能使精子进入女性阴道；阳痿又叫勃起功能障碍，有时还包括勃起困难，性高潮和射精障碍。

一般公认的是不能达到和维持足以进行满意性交的勃起，称为阳痿。

阳痿不能达到性高潮，不能使精子进入女性阴道，故不育。

早泄是指男性在性交时失去控制射精的能力，在阴茎插入阴道之前或刚插入即射精；或女性在性交中达到性高潮的频度不足50%；如果阴茎插入阴道之前已完成射精，则精子不能进入阴道而不育。

男性自身抗精子抗体是否能引起不育？

血-生精小管屏障的任何损伤都可引起抗精子抗体的形成。

如输精管梗阻、生殖道和睾丸的损伤、隐睾、生殖系感染、精索静脉曲张等；免疫抑制功能障碍：如精子与T淋巴细胞有共同抗原，能发生交叉反应；精浆中抑制物质的减少或缺乏也可产生抗精子的自身抗体。

由于产生抗精子的自身抗体，故导致患者不育。

<<不孕不育夫妇必读>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>