

<<实用中草药彩色图集>>

图书基本信息

书名：<<实用中草药彩色图集>>

13位ISBN编号：9787535921840

10位ISBN编号：7535921841

出版时间：2000-1

出版时间：广东科技出版社

作者：罗献瑞

页数：475

字数：300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用中草药彩色图集>>

内容概要

本图集第五册本着实用的宗旨，植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，仍取图文对照形式编排。

本册收载西南地区产的中草药211种，其中全草类82种，根和根茎类69种，茎、枝和树皮类17种，叶类15种，花类6种，果实和种子类17种，苔藓、菌类5种。

每种均附彩图，部分有药材图，对西南及其邻近地区从事中草药生产、经营、科研、教学及中草药业余爱好者鉴别原植物（动物、矿物）及药材，均有很好的参考价值。

<<实用中草药彩色图集>>

书籍目录

一、全草类 一匹莲 大唇羊耳蒜 大香附子 大盖球子草 小木通 小斑叶兰 小活血 小猪棕草
车前草 中华水芹 水川芎 水母雪莲花 风顶红 毛药 木莲金 汉荭鱼腥草 石韦 石苦蕒
石刷把 石生繁缕 四块瓦 四棱香 西南细辛 西南千金藤 地构叶 地黄瓜 过山龙 全叶马兰
异叶黄鹤菜 吊灯花 尖叶唐松草 纤冠藤 红陈艾 红毛走马胎 红鸡踢香 花佩菊 针筒菜
青皮草 抽心寒药 软筋藤 岩冬菜 苦丁 茅膏菜 刺子莞 虎头兰 虎皮草 盾果草.....二、根
和根茎类三、茎、枝和树皮类四、叶类五、花类六、果实和种子类七、苔藓和菌类中文名索引拉丁名
索引

<<实用中草药彩色图集>>

章节摘录

西南千金藤 别名 高原千金藤。

来源 本品为防己科植物西南千金藤 *Stephania subpe-llala* Hs Lo 的干燥全株。

原植物 西南千金藤(图25)为多年生草质藤本,全株无毛。

茎缠绕,细圆柱形,下部常生须状不定根,少分枝,有直沟纹。

叶互生,薄革质,卵状三角形、宽卵状三角形至三角形,长3.5cm—10cm,宽2.5cm—5.5cm,顶端常明显收缩,尾状渐尖至短渐尖,稍钝头,基部微凸,很少明显心形或微凸,全缘,掌状脉两面稍隆起;叶柄细而直,通常比叶片短,着生处距叶片基部约1mm~2mm,不明显盾状。

花单性,雌雄异株;单伞形聚伞花序腋生,总梗丝状,长1.5cm—7cm,末端簇生3个—5个小聚伞花序;小苞片狭披针形,早落;雄花:萼片6,2轮,外轮的卵形,内轮的近披针形,长约1.3mm,均尾尖;花瓣3,宽楔形,长约0.5mm。聚药雄蕊合生成盾状;雌花:萼片3,宽卵形,长约1.5mm,尾尖;花瓣3,宽楔形或扁圆形,长约0.6mm;柱头3裂。

核果宽倒卵形,成熟时红色,内果皮骨质,长4.5mm—5mm,背部有4行雕纹,中间的点状,两侧的小横肋状,胎座迹不穿孔。

生于海拔2000m左右的林下、沟边石缝中。

分布于云南、四川、广西等省(自治区)。

采收加工 全年均可采收,晒干。

药材性状 藤茎呈细长圆柱形,直径2mm—4mm;表面黄绿色,有细直沟纹,偶具须状不定根或分枝;体轻质脆,易折断。

叶卵状三角形至三角形,顶端常明显收缩,尾状渐尖至短渐尖,掌状脉向上的3条,平伸的2条,向下的常不可见;叶柄生于距叶片基部约1mm—2mm处。

单伞形聚伞花序腋生,疏散而少花,总梗丝状,末端簇生3个~5个小聚伞花序,花小。

核果。

气微,味苦。

性味和功 用苦、微辛,寒。

清热解毒,消肿止痛。

用于疮疡肿毒,咽喉肿痛,风湿热痹,胃热疼痛。

常用量9g—15g。

地 构 叶 别名 透骨草,瘤果地构叶、珍珠透骨草。

来源 本品为大戟科植物地构叶 *Speranskia tuberculata* (Bge.) Bail 的干燥全草。

原植物 地构叶(图26)为多年生草本,高20cm—50cm。

根茎木质化,深入土中。

茎直立,多分枝,有柔毛。

叶互生,披针形或长圆状披针形,长1.5cm—7cm,厚纸质,顶端钝尖或渐尖,基部楔形或钝圆,边缘有疏而不规则的粗齿,两面多少有短柔毛,脉上毛较密;叶柄短或近无柄。

花单性,雌雄同株;总状花序顶生,长5cm~20cm,雄花在上,具卵状椭圆形或披针形叶状苞片2枚,苞片内通常有花1朵—3朵;萼片5,稀4,披针形,有毛;花瓣5,稀4,鳞片状;雄蕊10~15;花盘腺体5;雌花生花序下部,萼片5~6,狭三角形,长约1mm,有稀毛;花瓣极小;子房有毛及疣刺,花柱3,2裂;花盘壶状。

蒴果扁球状三角形,具多数疣状突起,顶端开裂;种子三角状倒卵形,绿色。

生于干燥沙质土上、村边、草地。

分布于我国东北及大部地区。

采收加工 夏、秋季采挖,晒干。

药材性状 根茎圆柱形,长约10cm;表面灰黄色或土棕色,断面黄白色,木质状。

茎圆柱形,多分枝,长10cm~30cm,直径1mm~4mm;表面灰绿色或淡紫色,微有纵棱,被灰白色柔毛;质坚韧,易折断,断面黄白色,外圈有1层紫色的环。

<<实用中草药彩色图集>>

叶互生，多皱缩破碎，灰绿色，被灰白色柔毛，质脆，易脱落，完整者湿润后展开呈披针形或长圆状披针形，长1.5cm~7cm，宽0.5cm~2cm。

，叶柄短或近无。

枝梢有时可见总状花序或果序。

花小形。

蒴果三棱状扁圆形，表面具多数疣状突起。

气微，味淡。

以色绿、枝嫩、带果者为佳。

性味和功用 辛，温。

归心、肝经。

祛风除湿，活血止痛，舒筋。

用于风湿疼痛，筋骨拘挛，阴囊湿疹，寒湿脚气，疮癣肿毒。

常用量6g—15g；外用适量煎水熏洗。

孕妇忌服。

附注 本品在我国北方作透骨草使用。

地黄瓜 别名 肾气草、黄瓜香、白地黄瓜。

来源 本品为堇菜科植物紫花堇菜*Viola grypoceras* A Gray的干燥全草。

原植物 紫花堇菜(图27)为多年生草本，高达25cm。

主根深长；地下茎很短。

茎1至数条，直立或倾斜，节稀疏。

叶常三角状卵形或宽卵形，长1cm~6cm，顶端钝尖或圆形，基部心形或宽三角形，边缘有钝锯齿，齿尖具腺体，两面有褐色腺点；托叶线状披针形，边缘有栉状长齿；基生叶叶柄较长，茎生叶叶柄向上渐短。

花由茎基或茎生叶的腋部抽出，长6cm~10cm；萼片5，披针形，基部附属体半圆形；花瓣5，淡紫色，有褐色腺点，狭长椭圆形，下面1片有距，管状，长约7mm，直或略弯；雄蕊5；子房上位，柱头具喙，稍弯曲，不分裂。

蒴果椭圆形，长约1cm或稍短，密生褐色腺点；果梗直立。

生于沟边、草丛中或林下湿地。

分布于长江流域及以南各省(自治区)。

日本也有。

采收加工 春季采收，晒干。

药材性状 全草多皱缩成团。

主根长圆锥形，长3cm~5cm，直径1mm~3mm，灰黄色，粗糙，有须根及须根痕。

茎1条~数条，细圆柱形，节间较长，基部具宿存托叶。

基生叶少，叶柄细长，茎生叶互生；叶片三角状心形或宽卵状心形，顶端尖或钝，边缘有钝齿；托叶边缘有栉状长齿。

花梗自基部或茎叶腋部抽出，短于叶或与叶近等长，花淡紫色，下部1片有距。

有的具蒴果，成熟者3瓣裂，内含种子数枚。

叶两面、花瓣、果实均具褐色腺点。

气微，味淡、微苦。

以主根粗、枝叶多者为佳。

性味和功用 微苦，凉。

清热解毒，消肿，凉血，止血，化瘀。

用于化脓性炎症，乳腺炎，败血症，疮痍，肝炎，急性结膜炎，咽喉红肿，便血，刀伤出血。

常用量9g~15g。

外用适量捣敷或烧存性研末撒。

过山龙 别名 地刷子、小伸筋、舒筋草、扁枝古松。

<<实用中草药彩色图集>>

.....

<<实用中草药彩色图集>>

媒体关注与评论

本套图集原拟编写3集，主要收载华南地区出产的常用中草药，旁及少量外区出产的名贵中草药材和进口药材。

这一计划已于1994年8月顺利完成。

《实用中草药彩色图集》第一、二、三册出版后，不断收到读者及有关发行单位的来信，要求增收华南地区以外的品种，以满足这些地区中草药资源开发利用的需要，同时又可以使本书在更广泛的地区发挥作用。

我们认为上述读者的要求是合理的，是符合本图集编写宗旨的(详见第一册所载前言)，应尽可能给予满足。

为此邀约华南地区以外部分省区对当地中草药研究有造诣的专家分区编绘续集。

为了保证编绘工作严谨有序地进行，续编的每一分册均另设一主编，管理品种拟定，编绘人员遴选和图稿的审查等，以体现分工负责和文责自负的原则。

我国地域广阔，中草药的生产和应用常有明显的地区特色。

但植(动)物的分布与行政区域的划分并不一致。

因此，同一种植(动)物常常在不同的行政区域重复出现，反映在本书中也不可避免会出现少数品种重复，在保持每一册均能比较完整地反映相关地区出产的中草药概貌前提下，作者力求使重复品种减少到最低限度。

有些中药来源于2种以上的植物(动物、矿物)并且均为《药典》认可。

由于这些原植物(动物、矿物)常常分布于不同的地区，故亦可能以同一药名出现于不同的卷册中，本书以药名为第一名称，故这种重复是必要的和合理的。

我国药用植(动、矿)物品类繁多，笔者囿于见闻，书中出现错漏和不妥之处，敬希读者指正。

罗献瑞 1998年8月于广州

<<实用中草药彩色图集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>