

<<情趣宠物饲养百科>>

图书基本信息

书名：<<情趣宠物饲养百科>>

13位ISBN编号：9787538436945

10位ISBN编号：7538436944

出版时间：2008-1

出版时间：吉林科学技术出版社

作者：曲惠敏

页数：288

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<情趣宠物饲养百科>>

内容概要

《情趣宠物饲养百科》是目前国内情趣宠物收集品种最多的饲养全书。

《情趣宠物饲养百科》收集了64种各类个性宠物，详尽地介绍了科属种、别名、习性及饲养方法，更有实用的病害防治办法。

详细地说明了各种宠物适宜的饲养方法，具有极强的实用性和科学性。

用图解的方法向您介绍关于情趣宠物饲养及病虫害防治的具体方法，简单实用、操作易行。

<<情趣宠物饲养百科>>

作者简介

曲惠敏，从事专业野生物饲养十向年，对多种野生动物的习性有长时间的观察。虽为巾幗但为人人豪爽好友，宠友颇多。在工作实践和与宠友交流中积累了很多在家族宠物饲养实用可行的方法。

<<情趣宠物饲养百科>>

书籍目录

PART 1 软体类水母蜗牛PART 2 节肢类蝎子蜘蛛PART 3 昆虫类蝈蝈蝴蝶大黄蛉小黄蛉龙虱螳螂天牛蟋蟀PART 4 甲壳类河蟹寄居蟹PART 5 两栖类大鲵蝾螈蛙PART 6 爬行类暹罗鳄凹甲陆龟巴西龟豹斑象龟饼干龟鳄龟黄额盒龟黄腹彩龟黄喉拟水龟黄缘盒龟锯缘摄龟绿毛龟缅甸陆龟四眼斑龟乌龟亚洲巨龟滑鼠蛇灰鼠蛇尖吻蝮蛇烙铁头球蟒王锦蛇乌梢蛇眼镜蛇盔甲避役斗篷蜥盾甲蜥项圈蜥蜡皮蜥马加残趾虎美洲鬣蜥石龙子双领蜥新疆鬣蜥伊犁沙虎鬃狮蜥PART 7 哺乳类刺猬猕猴松鼠猴狐狸猫安哥拉兔仓鼠草原犬鼠龙猫松鼠土拨鼠

<<情趣宠物饲养百科>>

章节摘录

第一章 软体类 水母 身体特征 外形似伞，伞缘有很多触手，口位于腹侧中央，有的有长口管，或有长口腕。

可分小型的水螅水母和大型的钵水母两类。

水母属于腔肠动物门，钵水母纲。

水母的身体由一个伞状的胶状物质组成。

下方有许多触手，借助伞内肌肉收缩，水母可以在海面上一起一伏地游动。

由于它体内的消化腔经口与外界相通，因此以前将这一类的动物称为腔肠动物，现在则将它们称为刺细胞动物。

水母触手上有很多刺细胞，遇到刺激时就会放出卷曲的丝状物缠住食物。

有的刺细胞末端有倒钩或刺，能将毒液注入猎物体内，使其麻醉。

腹侧中心的口部或口道上的小洞可猎食浮游生物。

伞缘上的触手，少的有4只，多则达到数百只。

生活习性 水母能生活在所有水域，包括淡水。

水母大多栖息于温暖的浅水海域，饲养时则以恒温为佳。

水母会在白天光合作用结束时至海水表面进食浮游植物。

人工饲养时食物来源较为困难。

肉食型则于晚上8~12时才开始觅食，可以喂食孵化出的丰年虾。

有的身体没有刺胞，但是身体侧面有成列栉枝，是属于栉水母类，属于外洋性，利用水波而游动，吞食大动物运动时会产生红色荧光。

由于水母与其他腔肠动物一样有毒刺细胞，因此水母不适合与其他鱼类饲养在一起。

获取途径 可以在有水母出现的水域捕获。

有些水族商店也会经营水母，但大多数水族店所提供的都是海水水母。

饲养环境（容器） 必须用800升以上的大玻璃缸。

一般以长、宽、高各约为水母圆盘直径的10倍空间较适合。

食物种类 水母除了可以喂食刚孵化的丰年虾外，也可以喂食水蚤或轮虫。

饲养方法详解 水母最好养在捕捞到它的水域的原生水中，适宜的水温保持在10~25。

水温不要太低。

水质要新鲜。

水母比一般海水鱼难养是因为它只喜欢吃活饵却不吃死饵，而且食量大，消化又快，所以您得要准备许多活饵来喂食，且一天至少要喂食两次以上。

如果您是住在海边的话，就可以天天用很细的网具在海水中捕捞浮游动物供水母吃食，不过这不是都市家庭所能够做到的。

另一种较可行的方法则是购买干燥且处理过的丰年虾卵，自行用海水打气孵化，以作为水母的食物。

不过丰年虾卵大都是进口的且价钱较贵。

此外，水母也不太适合和一般海水鱼混养，因为它可能会吃其他的小鱼，也可能被其他较大的鱼吃掉。

水母没有头脑，也没有骨骼，但有散漫性的神经网络，如果其中一个触手接触到其他物体，则所有的触手也会一齐收缩，所以养水母的水缸要足够大，这样它的触手才能完全地伸展及运动自如。

一般以长宽高各约为水母圆盘直径的10倍空间较适合。

不过，缸子太大也会降低水母的捕食效益，您得投放更多的活饵才行。

水母也不能养在具有一般传统式过滤设备的水族箱内，以免水母被抽吸到导致受伤或死亡。

您可以利用简单气泡石打气，但必须定时清理缸底，因为水母吃得多，吐出的残渣也多。

如果以上的设备条件您都具备了，那你养的水母大概就可以存活两三个月左右。

如果您养了一段时间感觉厌倦或心存慈悲，也请不要随意放生，以免放生水域的生态遭受池鱼之殃。

繁殖方法 一般市面上的水母属于有性世代的个体。

<<情趣宠物饲养百科>>

当水母长大成熟之后，雄性水母会排放精子到雌性水母的体内与卵子结合形成受精卵，再由雌性水母排出成长为浮浪幼虫。

浮浪幼虫在水中生长一段时间后，会着生于水草或其他基底上而形成花虫体。

花虫体是属于无性世代的个体，成长一段时间后会以横裂分体法的方式向上分生许多碟状体，每一碟状体成长后会脱离花虫体而形成自由的小水母，长大后便又周而复始地行有性生殖。

也因为如此的生殖方式，海水母在春季水较温暖及光线较充足时，便会集结在水流较缓且食物较多的海湾或潟湖区进行生殖。

病害防治水母的生命力很强，所以只要平时掌握好水温与水质就行。

注意事项 水母身体上的触手都有刺胞，可用来捕食或防御。

有些种类刺到人类时会引起剧痛甚至会使人致命。

水母触须引起的刺痛很剧烈，但通常是短暂的，所以被蛰后不要慌张，可以采取以下步骤处理伤口：

- 1.如果看见伤处有触须，用镊子或干净指甲将其轻轻拔出。
- 2.用水清洗伤处后，倒上醋或酒，这样有助于对抗蛰伤引起的刺激性化学反应。
- 3.使伤者保持安静。
- 4.用冰袋、冷水或类似物冷敷伤处。
- 5.如果伤者出现严重反应症状（过敏性休克），必须尽快去医院急诊。
- 6.如果疼痛在1~2小时内不缓解，要咨询医生。

蜗牛 身体特征 壳呈低圆锥形，右旋或左旋。

头部显著，触角两对，后一对顶端有眼。

腹面有扁平宽大的腹足。

生活习性 喜阴暗潮湿隐蔽的环境，昼伏夜出，对强光刺激很敏感。

喜钻入疏松的腐殖土中栖息、产卵、调节体内湿度和吸取部分养料，时间可长达12小时之久。

杂食性和偏食性并存。

喜潮湿但怕水淹。

水淹可使蜗牛窒息。

在潮湿的夜间投入湿漉的食料，蜗牛的食欲活跃。

自食生存性。

小蜗牛一孵出，就会爬动和取食，不需要母体照顾。

当受到敌害侵扰时，它的头和足便缩回壳内，并分泌出黏液将壳口封住，具有很强的忍耐力。

当外壳损害致残时，它能分泌出某些物质修复肉体 and 外壳。

蜗牛具有惊人的生存能力，对冷、热、饥饿、干旱有很强的忍耐力。

喜恒温。

养殖温度恒定在25 ~ 28 之间，生长发育和繁殖旺盛。

获取途径 可以在野外捕捉，亦可在宠物商店购买。

饲养环境（容器） 为了便于蜗牛生长和欣赏蜗牛，一般选用30厘米高、40厘米宽、50厘米长的玻璃缸或塑料盒，顶部要加盖，以防蜗牛逃跑。

在容器上部的10厘米处要打出一些透气用的小孔。

容器底部要铺好饲养土。

可选用未受污染的园田腐殖土2份、河沙1份，混合均匀，经太阳暴晒或用紫外灯照射3~5日，以杀灭和消除寄生虫卵、各种昆虫卵和幼虫及其他病原微生物。

筛去石块和杂物，将疏松的泥沙土铺衬在饲养箱内。

饲养土的湿度控制在30%~40%为宜，简便的测试方法是以手捏泥土成团但不滴水，并且手松开后泥土会很快散开。

饲养土铺垫的厚度一般为7~10厘米，可以在饲养土下面先铺一层3~5厘米的小鹅卵石或小碎石块，以增加饲养土的透水性和透气性。

饲养土应经常保持清洁、疏松。

投喂食物要定量、定时、定点，过剩或发霉食物要及时清除。

<<情趣宠物饲养百科>>

饲养土一般每1~2周即更换一次，否则会滋生各种细菌、螨虫等，影响蜗牛的生长繁殖。

食物种类 主食可喂麦麸、米糠及粉状粮食，副食喜新鲜蔬菜、水果等。

投喂的青菜、饲料应合理搭配。

要注意钙、磷及维生素的补充和供给。

参考饲料配方：米糠70%、粗面粉10%、小麦粉10%、蚕豆粉5%、马铃薯粉5%，加适量钙粉。

投喂饲料前，应先喷洒清水，以引诱蜗牛觅食。

另外，在日常饲喂中，每隔2周可在饲料中添加适量氯霉素或土霉素（比例500：1），以增强体质。

干酵母对于促进食欲，预防疾病十分有效。

日常饲料中可以经常添加。

饲养方法详解 蜗牛属昼息夜出动物，投喂食物最好在傍晚。

尤其是在夏季，一些蔬菜、野菜、瓜果皮和植物叶等水分容易蒸发。

饲料存放时间过长易引起腐烂变质，傍晚投喂可缩短存放时间，保证饲料新鲜。

投喂米糠、甘薯粉等精饲料，可和水一起投入食槽或食盘，供其食用。

适宜的温度和湿度是蜗牛健康的关键之一。

养殖蜗牛的温度应控制在25~30℃，最适生长温度为25℃左右。

在入冬和初春季节，要防止突然降温，以免造成蜗牛死亡。

饲养期间，最好每天早、晚喷雾状水一次。

切忌将水直接喷在蜗牛身体上，更不可用冷水浸泡。

为使饲养环境保持一定的湿度，饲养箱、土壤的相对湿度不能低于30%或大于50%。

菜叶、瓜果等青饲料投喂前应清洗干净，沾污或残留农药的青饲料，必须经浸泡、洗净后投喂，以防蜗牛中毒死亡。

越冬保种是蜗牛养殖中不可忽视的一个环节。

在昼夜温差较大的地区，尤其在秋末冬初或初春气候易变季节，室内气温最少应保持18℃以上。

饲养土的土表湿度要保持在25%~35%，空气相对湿度85%~90%，能湿不干，控湿、保湿采取塑料布盖顶。

防止干风、冷气直接吹进，进口应采取双门、挂布、挡风板。

饲养土必须控制在pH值6.5~7.5，切忌使用施过农药、化学物质的污染沙土。

养殖容器一定要具有很好的透水性和透气性。

1~3个月小蜗牛饲养池内加湿，坚决不能直接用水泼，应采用喷雾器喷，最好用温水。

繁殖方法 蜗牛雌雄同体，异体交配，雌雄均产卵。

蜗牛本身既当爹又当娘。

两只蜗牛相互配合，双方将恋矢（阴茎）反复刺激对方的生殖孔，经过激烈刺插运动，双方阴茎便都会在对方的阴道中射精。

受孕10天后，双方均可产卵，再过8天后卵可孵化出小蜗牛。

发情的蜗牛每次的交配时间为2~3个小时，有的长达6小时以上。

蜗牛每分钟可产卵2粒，每次产卵时间长达1~2小时，有的在3小时以上。

蜗牛在产卵过程中，常因饲养不良、营养缺乏、虚脱难产而死亡。

病害防治 蜗牛抗病能力强，一般很少有疾病发生。

但是，在人工饲养的条件下，也容易患结核病、烂足病、脱壳顶病等。

现将防治方法介绍如下：**结核病**主要由于饲养土过湿，甚至发生腐烂所致。

除平时控制好湿度外，可在精饲料中加入药物雷米封，比例为每500克饲料含1毫克，连用5天即可治愈。

用雷米封2片，调清水500毫升喷洒，有很好的预防效果。

烂足病主要由于蜗牛腹足受外伤、发炎腐烂所致。

要注意平整养殖箱的尖状突起物。

治疗可采用高锰酸钾（浓度1ppm）消毒，涂上金霉素或红霉素软膏，每天~次，3~5天即可治愈。

<<情趣宠物饲养百科>>

脱壳顶病主要是缺钙所致。

除日常注意补充钙质丰富的食料外，可在饲料中掺入适量老墙土（陈石灰），略带石灰气即可。单独饲喂1周左右，同时，在饲料中添加土霉素及钙，即可治愈。

注意病蜗牛要隔离饲喂。

另外，在日常饲喂中，每隔2周可在饲料中添加适量氯霉素或土霉素（比例500：1），以增强体质。

干酵母对于促进食欲、预防疾病十分有效，日常饲料中可以经常添加。

注意事项 养蜗牛时尽量不要用手接触蜗牛的软体部分，因为有些品种的蜗牛体液有毒。所以家养蜗牛最好选择那些食用蜗牛品种，这样最安全。

第二章 节肢类 蝎子 身体特征 蝎子通常用它的两只大而有力的钳子来捕食，食物绝大部分是蜘蛛和昆虫。

只有当猎物挣扎时，它才会使用毒刺。

生活习性 在世界上所有暖热的地区，特别是沙漠，都能发现蝎子。

蝎子白天常躲在岩石或木头下。

那些爬进房子内的蝎子则躲在地毯下、床上或是鞋子里，十分危险。

某些种类的蝎子，尤其是20厘米长的非洲蝎子，它们的毒刺可以致人于死地。

蝎子喜独居，相互间好斗。

因此要使交配成功，在雄蝎接近雌蝎时就要格外小心。

蝎子好静不好动，昼伏夜出进行捕食、饮水和交尾活动。

在4 ~ 20 的条件下，4 ~ 5个月不饮食也不会死亡。

温度对蝎子的生长发育和繁殖起着决定性的作用。

蝎子很怕冷，从深秋至翌年春天这段时间，要将饲养箱放在避风和较温暖的室内，在冬季很冷的季节，要设法在室内加温，最好要使温度保持在28 ~ 32 。

在自然界中，温度下降至8 ~ 10 时蝎子开始冬眠；温度在10 ~ 12 时蝎子开始起蛰活动；温度在22 ~ 35 之间，生长发育正常；温度在33 ~ 36 时活动最旺盛，食欲也最强，生长发育快，蜕皮顺利，交尾现象也多，这是蝎子生长发育和繁殖的最佳温度。

当温度超过39 时，蝎子处于半昏迷状态，潜伏于窝内不吃不动。

温度在18 ~ 20 之间，蝎子则食欲低下。

温度低于10 时，蝎子集聚成团，不吃不动进入休眠状态。

蝎子对湿度也有较为严格的要求，多数人认为蝎子喜欢潮湿，其实不然。

蝎子是喜干怕湿的，但过于干燥也不利于蝎子生长发育，所以，在一般情况下应保持昼湿夜干和窝内干活动场地湿的原则，使其池底或盆底的泥土含水量在15% ~ 20%之间，空气相对湿度在75%为最佳湿度。

正常养殖条件下，蝎子寿命可长达8年。

获取途径 宠物市场购买或自行捕获。

蝎子的毒性可致人于死地，所以野外捕获时一定要请专家现场指导，同时注意防蛇防虫。

如在山区还要注意防摔伤。

市场购买挑选时仔细看它的肢体有没有残缺，不要选择行动迟缓或者软弱无力的蝎子。

饲养环境（容器） 可用内径为40 ~ 50厘米，高为20 ~ 30厘米的瓷盆或塑料盆作为蝎池。

盆内壁必须光滑，以免蝎子爬出盆外逃逸。

在盆底放一层无农药和没被化肥污染的风化土或选用沙砾、泥土、苔藓、树皮，碎石片、瓦砾等做垫材。

根据品种而有差异。

垫底物的深度最好不少于5厘米。

建议深度为10 ~ 15厘米。

摊平压实。

在盆内距盆边8厘米的盆中央颠倒叠放瓦片，瓦片叠放的高度可略高过盆上口，这样可增大饲养面积。

<<情趣宠物饲养百科>>

，并在瓦片与瓦片之间要留出适当的空隙，以便蝎子活动和进出。
而且盆壁上端四周要贴上0.2米高的玻璃或塑料膜，以防蝎子爬出外逃。
或用透明的长方形塑料箱饲养，垫材同上。

箱子必须有牢固的盖子，以防蝎子逃脱和发生意外，箱盖上应留几个透气的洞孔。

蝎池周围要求安静、通风、保温、排水良好，光照充足。

蝎子虽然白天栖息暗处，害怕强光照射和阳光暴晒，但也需要一定的光照。

食物种类 养蝎的食料主要是黄粉虫、还有土元、蚂蚱、蚯蚓、蟑螂、蟋蟀、蜈蚣、苍蝇等昆虫，也可喂点鸡肉、鼠肉之类的小肉片粒。

上面稍喷点水。

以便让蝎子得到一点水分。

饲养方法详解 出生后的幼蝎在7~10天内可以不吃食物，靠卵黄供应营养照样生长。

4~6天开始第一次蜕皮，蜕皮后身体呈棕黄色，称为2龄蝎。

刚蜕皮的仔蝎明显增大。

在母蝎周围活动，母蝎乘仔蝎离开自身的机会，用尾刺将自己背上仔蝎蜕下的皮开掉。

待清理干净后，仔蝎又重新爬到母蝎背上由母蝎继续背负。

再过4~5天后，仔蝎离开母背而独立生活，仔蝎在母背上要呆10天左右。

在这期间母蝎很少活动，也不外出寻觅食物。

它的主要任务就是保护仔蝎，寻找安全环境。

一旦母蝎受惊，母蝎就会将仔蝎抛弃或吃掉而逃走。

蝎子从出生到能繁殖需经过6次蜕皮，成为7龄蝎即为成蝎，在自然环境中需要3年时间。

投食时将黄粉虫放在小塑料盘中，再将小盘放在蝎子经常活动，觅食的场地上。

也可多喂一点食料，以免蝎子争食凶斗造成互相残害。

<<情趣宠物饲养百科>>

编辑推荐

《情趣宠物饲养百科》是从事专业野生动物饲养十几年，对多种野生动物的习性有长时间的观察。
生活实用百科系列，民间经验总结版。
工作实践和与宠友交流的积累，十几年间养宠物经验总结，多年的民间宠友，信件交流体会的精华。
来自民间宠物饲养高手的经验总结，多年的民间宠友信件交流体会的精华。

<<情趣宠物饲养百科>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>