

<<头颈部影像病例点评200例>>

图书基本信息

书名：<<头颈部影像病例点评200例>>

13位ISBN编号：9787565901805

10位ISBN编号：7565901806

出版时间：2012-1

出版单位：北京大学医学出版社有限公司

作者：（美）尤瑟姆，莫塔 编著，郭庆乐，赵丽君 译

页数：314

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<头颈部影像病例点评200例>>

### 内容概要

本书作为畅销丛书中的一册,涵盖了200个病例,443幅高质量图片,帮助读者全面掌握头颈影像最新的知识要点。

本书是您理想、简便、实用的专科自测工具书!

- 以多种形式全方位透视头颈影像知识,包括鉴别诊断、相关影像学发现和临床观点等
- 涵盖新的和扩充的三维重建立体成像骨骼病变,新的MR技术(包括光谱技术、散射技术、磁化转移技术、三维FIESTA,以及弥散张量成像)等
- 包括Grossman和Yousem所著Neuroradiology The Requisites(第2版)一书的推荐阅读,帮助读者学习更为深入的专业知识
- 对照美国影像学口试及CAQ试的形式,提供给读者最为事半功倍的复习资料

<<头颈部影像病例点评200例>>

作者简介

作者：（美国）尤瑟姆（David M.Yousem）（美国）莫塔（Ana Carolina B.S.Da Motta）译者：郭庆乐  
赵丽君

<<头颈部影像病例点评200例>>

书籍目录

基础篇

病例1

答案：颅底骨折

病例2

答案：鼻咽黏膜的黏液滞留性囊肿

病例3

答案：多结节性甲状腺肿

病例4

答案：扁桃体周围脓肿

病例5

答案：甲状腺性眼病

病例6

答案：黏液囊肿

病例7

答案：眼眶壁骨折

病例8

答案：杓状会厌皱襞鳞状细胞癌

病例9

答案：下颌下腺结石

病例10

答案：多形性腺瘤

病例11

答案：椎周脓肿

病例12

答案：侵入喉内的甲状腺癌

病例13

答案：鼻窦未分化癌

病例14

答案：中耳乳突炎

病例15

答案：颅底软骨肉瘤

病例16

答案：皮肤癌

病例17

答案：脂肪瘤

病例18

答案：眶血管瘤

病例19

答案：鼻窦发育

病例20

答案：小管内前庭神经鞘瘤

病例21

答案：HIV相关囊肿

病例22

答案：鼻窦息肉

<<头颈部影像病例点评200例>>

病例23

答案：囊性结节性病灶

病例24

答案：鼻咽淋巴瘤

病例25

答案：喉膨出

病例26

答案：颞下颌关节渗出和双层区感鲸

病例27

答案：Tornwaldt囊肿

病例28

答案：声门上癌

病例29

答案：下颌骨折的三维重建

病例30

答案：眼球癆

病例31

答案：泡状鼻甲

病例32

答案：腮腺囊肿

病例33

答案：颈静脉血栓

病例34

答案：颞骨骨折

病例35

答案：线沟囊肿

病例36

答案：矢状缝早闭

病例37

答案：前顶部脑疝

病例38

答案：甲状舌管囊肿

病例39

答案：Pott头皮肿瘤

.....

提高篇

挑战篇

<<头颈部影像病例点评200例>>

章节摘录

版权页：插图：神经鞘瘤与副神经节瘤 1.神经鞘瘤、副神经节瘤、脑膜瘤、血管瘤、表皮样囊肿和肿瘤转移。

2.面神经血管瘤。

3.会，支配镫骨肌的第 对脑神经纤维距此水平较远，但也可受累。

4.动态扫描（见点评部分的解释）。

参考文献 Vogl TJ, Mack MG, Juergens M, et al: Skull base tumors: gadodiamide injection-enhanced MR imaging-drop-out effect in the early enhancement pattern of paragangliomas versus different tumors, Radiology 188:339-346, 1993. 延伸阅读 Neuroradiology : THE REQUISTTES, pp 725-728. 点评有几个表现可用于鉴别副神经节瘤和神经鞘瘤。

对于神经鞘瘤，因其内部Antoni.A和Antoni.B（常发生囊性变，椭圆形，沿脑神经和外周神经分布）两种类型的组织分布不一，故表现为信号强度不均以及增强。

副神经节瘤较大时，有流空影；虽有斑点状信号增强影，但较前者信号更为均一。

颈动脉鞘、迷走神经、颈动脉杈、颅底和内耳为其特征性发病部位。

但也有许多情况下，均一增强的小神经鞘瘤与均一增强的小副神经节瘤，后者因太小而无流空现象，二者看起来类似。

在这种情况下，应在肿块的一个位置采取动态扫描的方法以确定造影剂摄取情况。

采用钆或碘基造影剂，副神经节瘤约在标记30~45秒时出现下倾，而神经鞘瘤则无此下倾现象。

副神经节瘤造影剂摄取的斜率也比神经鞘瘤更为垂直。

最后，仍有些病例需行细针抽吸或传统血管造影术，以显示副神经节瘤的红晕（blush）现象。

栓塞疗法可帮助外科医生减少摘除术中的出血。

（乔建民译赵艳生校）病例98 骨硬化症 1.骨硬化症、骨发育障碍矮小症、颅骨骨干发育不全、地中海贫血和镰状细胞性贫血。

2.成骨不全、软骨成长不全、磷酸酶过少症、Menke综合征和佝偻病。

3.骨硬化症（缘于视神经管侵蚀的视神经萎缩）。

4.常染色体隐性遗传型（缘于骨一破骨细胞界面的酸化缺损）出生即发病，而常染色体显性遗传型则在1~10岁发病。

<<头颈部影像病例点评200例>>

编辑推荐

《头颈部影像病例点评200例(第2版)》对照美国影像学口试及CAQ测试的形式, 还提供给读者最为事半功倍的复习资料。

<<头颈部影像病例点评200例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>