

<<癌症用药配餐指南>>

图书基本信息

书名：<<癌症用药配餐指南>>

13位ISBN编号：9787810869478

10位ISBN编号：7810869477

出版时间：2011-5

出版时间：第四军医大学

作者：马洪悦，杨晓颖

页数：255

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<癌症用药配餐指南>>

### 内容概要

本书是一本癌症患者的用药配餐指南，共分为三部分，包括癌症的基本常识、癌症的用药常识及癌症的药膳食疗，为癌症患者的用药、饮食及保健提供全面的解析，是癌症患者的良师益友、家庭医生。

我们衷心地希望癌症患者通过阅读此书，对癌症有更深入的了解，了解更多的用药常识，增强与病魔抗战到底的决心及信心，早日康复。

需要注意的是，由于患者病情不同及个体差异，书中介绍的有关知识仅供患者日常用药和饮食参考借鉴，读者在阅读本书的同时，还应接受临床医生的治疗和指导。

## <<癌症用药配餐指南>>

### 书籍目录

#### 第一篇 了解癌症，关注健康

##### 第一章 癌症基本常识

什么是癌症

什么是“癌症性格”

良性肿瘤和恶性肿瘤怎样区分

哪些体检能发现早期癌症

儿童患癌的常见信号

警惕内脏肿瘤的皮肤表现

不同类型的阴道恶性肿瘤的表现

哪些癌症遗传性较明显

##### 第二章 癌症患者最关心的问题

癌症可以预防吗

癌症与职业密切相关吗

睡眠不足易患癌吗

癌症患者失眠怎么办

癌症能“自然消退”吗

癌痛的原因与误区有哪些

癌症转移有哪几种方式

警惕几种常见的癌前病变

癌症患者康复期应注意什么

癌症患者该如何自我调节

#### 第二篇 科学用药，保障健康

##### 第一章 癌症的用药常识

癌痛时，怎样选择止痛药

如何选用抗癌药

抗癌药有哪些不良反应

哪些药物可治病也可致癌

怎样合理用药

家庭用药要注意哪些问题

感冒时用药有哪些误区

如何正确认识化疗

哪些情况下需要暂停化疗

吗啡止痛会成瘾吗

化疗药物有哪些种类

##### 第二章 癌症常用药物

烷化剂

抗代谢类

抗生素类

植物类

激素类

免疫抑制剂

中成药

注射剂

##### 第三章 常见癌症的用药方略

肺癌

## <<癌症用药配餐指南>>

胃癌  
肝癌  
结肠癌  
食管癌  
前列腺癌  
乳腺癌  
宫颈癌  
白血病  
肾癌  
卵巢癌  
皮肤癌  
淋巴瘤  
膀胱癌  
胰腺癌  
口腔癌

### 第三篇 膳瞻食疗，吃出健康

#### 第一章 癌症患者配餐常识

不同时期的饮食原则

有抗癌作用的食物

癌症患者的饮食禁忌

可减轻化疗毒性反应的饮食

化疗期间如何增加食欲

服药期间的饮食禁忌

改善化疗呕吐的非药物措施

化疗期间的食疗原则

#### 第二章 癌症的合理配餐

肺癌食疗食谱

胃癌食疗食谱

肝癌食疗食谱

结肠癌食疗食谱

食管癌食疗食谱

前列腺癌食疗食谱

乳腺癌食疗食谱

宫颈癌食疗食谱

白血病食疗食谱

肾癌食疗食谱

卵巢癌食疗食谱

皮肤癌食疗食谱

淋巴瘤食疗食谱

膀胱癌食疗食谱

胰腺癌食疗食谱

口腔癌食疗食谱

## &lt;&lt;癌症用药配餐指南&gt;&gt;

## 章节摘录

**警惕内脏肿瘤的皮肤表现** 隐匿的内脏肿瘤在皮肤上或多或少可找到一些蛛丝马迹，掌握和了解这些皮肤病变与内脏肿瘤的关系，对某些肿瘤的早期发现和确诊大有益处。

内脏肿瘤的皮肤表现主要有：  
1. 皮肤炎 皮肤炎属自身免疫性肌肉炎症性疾病，是一种皮肤和肌肉的弥漫性非感染性炎症疾病。

炎症性肌病。

眼睑、鼻梁、面颊、前额和指甲周围的皮肤呈现紫红色红斑，特别是上眼睑和眼眶周围出现的红斑和肿胀，颜色宛如葡萄酒色，被称为紫红眼睑。

皮肤炎的内脏癌肿合并率为20%-30%，合并的肿瘤以乳腺癌、肺癌为多。

皮肤炎中的皮损与癌肿关系甚为密切，皮损如呈大红色充血，则提示有合并内脏癌肿的可能。

2. 皮肤红斑 离心性环状红斑的特征是皮疹开始时为红色斑丘疹，呈离心性扩大，而中央消退，每日可以1至数毫米速度扩大，直径在10厘米以上的也不少见，好发于躯干，特别是臀部。

形态变化急速，瘙痒显著，皮疹形态不一者与癌肿关系更为密切。

合并的肿瘤常为乳腺癌、肺癌等。

3. 黑色素增多 当肾上腺受癌侵犯时，肾上腺皮质功能不全，不能抑制垂体分泌的黑色素细胞刺激素；发生垂体肿瘤时，黑色素细胞刺激素分泌也增加。

所以，肾上腺和垂体患癌时，皮肤黑色素增多，肤色变黑。

4. 带状疱疹 研究表明，带状疱疹患者中约12.1%合并内脏癌肿。

年龄越大，患病几率就越大，50岁以上的带状疱疹患者合并癌肿达18%。

所合并的恶性肿瘤以淋巴系统恶性肿瘤为最多，其他有胃癌、肺癌、肠癌、食管癌等。

合并有内脏癌肿的带状疱疹有其特殊的表现。

一般的带状疱疹大多局限于身体的一侧，并且是终生免疫的，而恶性肿瘤合并的这种疱疹为全身散在性分布，并且经常反复发作。

5. 匍行性回状红斑 是一种呈木纹形、波形的环状红斑，其移动和形态变化更快，常有显著瘙痒。

有人指出，几乎所有病例均合并有内脏癌瘤，如乳腺癌、肺癌、头颈部癌等。

红皮症表现为皮肤持续潮红、脱屑、剧烈瘙痒，有人报告40岁以上者1/3-1/2有潜在淋巴瘤存在。

⋮

<<癌症用药配餐指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>