

<<乡村兽医知识实用手册>>

图书基本信息

书名：<<乡村兽医知识实用手册>>

13位ISBN编号：9787811179859

10位ISBN编号：7811179857

出版时间：2010-4

出版时间：中国农业大学

作者：唐山市畜牧水产局 编

页数：148

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<乡村兽医知识实用手册>>

### 前言

修订后的《中华人民共和国动物防疫法》（以下简称《动物防疫法》）做出了乡村兽医服务人员可以在乡村从事动物诊疗服务活动的规定—2008年11月4日农业部第8次常务会议审议通过了《乡村兽医管理办法》，该办法已于2009年1月1日起施行。

该办法的实施，为依法加强乡村兽医从业管理，提高乡村兽医业务素质和职业道德水平，保障乡村兽医合法权益，保护动物健康和公共卫生安全，全面推行乡村兽医登记制度奠定了基础。

按照管理办法和农业部的部署，各级畜牧水产行政主管部门按照组织发动、资格初步审核、培训考试与考核、发放乡村兽医登记证四个步骤，对在乡村从事动物诊疗服务活动的兽医实施登记与管理工作。

为确保乡村兽医人员登记和培训质量，我们组织具有理论和实践经验的专家，编写了《乡村兽医知识实用手册》。

本书参照《动物防疫法》和农业部相关管理规定，从动物免疫基本知识、动物诊疗注意事项、消毒技术规范、兽药使用常识、动物检疫相关知识以及采样抽样技术规范和相关法规与规定七个方面，介绍了乡村兽医应知应会的基本知识，针对性和实用性较强，是乡村兽医从业和各级畜牧水产行政管理者、执法者学习的重要参考资料。

通过相关知识的学习与培训，使各级畜牧兽医行政管理者、执法者能够认真贯彻有关动物防疫法律法规和规定，履行好法定职责，切实做好动物防疫和畜产品质量安全工作。

特别是通过学习。

使乡村兽医人员不但能够认真履行有关动物防疫法规规定的义务，而且成为动物防疫相关法规的社会宣传员、义务监督员。

## <<乡村兽医知识实用手册>>

### 内容概要

《乡村兽医知识实用手册》参照《动物防疫法》和农业部相关管理规定，从动物免疫基本知识、动物诊疗注意事项、消毒技术规范、兽药使用常识、动物检疫相关知识以及采样抽样技术规范和相关法规与规定七个方面，介绍了乡村兽医应知应会的基本知识，针对性和实用性较强，是乡村兽医从业和各级畜牧水产行政管理者、执法者学习的重要参考资料。

## <<乡村兽医知识实用手册>>

### 书籍目录

第一章 重大动物疫病强制免疫知识第一节 重大动物疫病的概念及病种第二节 强制免疫工作的几项要求第三节 动物疫病免疫通用技术第四节 主要动物疫病免疫技术要点第二章 生物安全措施第一节 生物安全概念第二节 动物疫病诊疗过程中的生物安全隐患与措施第三节 疑似重大动物疫病处置时的生物安全隐患与措施第四节 免疫及接种的生物安全隐患和措施第五节 样品采集、保存和运输过程中的生物安全隐患和措施第三章 采样第一节 采样原则第二节 样品采集第三节 样品的记录、包装、保存和运输第四章 消毒第一节 概述第二节 常用消毒药第三节 消毒方法第五章 兽药使用基本常识第一节 兽药常识第二节 兽药使用与经营常识第三节 兽药管理第六章 动物检疫基本知识第一节 概述第二节 产地检疫第三节 屠宰检疫第四节 动物检疫证明参考文献附录一 中华人民共和国动物防疫法附录二 乡村兽医管理办法附录三 执业兽医管理办法附录四 动物诊疗机构管理办法附录五 动物检疫管理办法附录六 动物防疫条件审查办法附录七 乳用动物健康标准附录八 一、二、三类动物疫病病种名录附录九 兽药停药期规定

## <<乡村兽医知识实用手册>>

### 章节摘录

(4) 禁忌：活苗饮水免疫前后2~3天禁止饮用消毒药水、喷雾消毒动物，使用活菌苗免疫后1周内，不得使用抗菌类药物。

(5) 注射要领：皮下或肌肉注射进针要稳，拔针要慢，防止打“飞针”。

家畜注射部位要先消毒、后注射。

(6) 注射针头选用：根据防疫动物种类准备足量的适宜长度的针头。

一般防牛应用12~16号、长度为24毫米的针头；防猪用12~16号、长度为24~38毫米的针头；防羊用12号、长度为12毫米的针头；防禽用6~12号、长度为5~12毫米的针头。

在注射疫苗前根据动物的大小、肥瘦程度适当调整针头的粗细和长度。

肌肉注射以注射到机体肌肉层且所注疫苗液不流出为准；皮下注射在保证抽、注顺畅的情况下，针头越细越好；皮内注射一般使用4号的细短针头。

家畜一畜更换一次针头，家禽至少1散户或50只左右更换一次针头。

(7) 消毒：疫苗瓶塞先用75%酒精消毒，然后用无菌的针头抽液，瓶塞上应固定一个针头，只用它抽取疫苗，禁止使用注射过的针头再次抽取疫苗。

吸出的疫苗液不得再回注于瓶内。

注射部位用70%~75%酒精或5%碘酊棉球擦净消毒，再用挤干的酒精棉擦干消毒部位。

卡标部位先剪毛、消毒，然后佩戴消毒的耳标。

(8) 免疫剂量：疫苗免疫剂量要适中，过小起不到作用，过大易导致免疫麻痹。

(9) 废弃物处理：废弃针头、疫苗、棉球等切忌乱扔，应集中焚烧或深埋处理，防止散毒或被动物误食。

(10) 紧急免疫顺序：由受威胁区到疫区再到疫点。

.....

<<乡村兽医知识实用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>