

<<临床执业助理医师模拟试卷>>

图书基本信息

书名：<<临床执业助理医师模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787811361933

10位ISBN编号：7811361930

出版时间：2009-6

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：张银合,《国家执业医师资格考试模拟试卷》专家编写组 编

页数：105

字数：150000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<临床执业医师模拟试卷>>

内容概要

全真实战模拟，四套精选试题，紧扣考试大纲，综合考查要点，强化题型训练，增强应考能力。

<<临床执业助理医师模拟试卷>>

书籍目录

2009年国家执业医师资格考试（一）第1单元2009年国家执业医师资格考试（一）第2单元2009年国家执业医师资格考试（一）第3单元2009年国家执业医师资格考试（一）第4单元2009年国家执业医师资格考试（二）第1单元2009年国家执业医师资格考试（二）第2单元2009年国家执业医师资格考试（二）第3单元2009年国家执业医师资格考试（二）第4单元2009年国家执业医师资格考试（三）第1单元2009年国家执业医师资格考试（三）第2单元2009年国家执业医师资格考试（三）第3单元2009年国家执业医师资格考试（三）第4单元2009年国家执业医师资格考试（四）第1单元2009年国家执业医师资格考试（四）第2单元2009年国家执业医师资格考试（四）第3单元2009年国家执业医师资格考试（四）第4单元

<<临床执业助理医师模拟试卷>>

章节摘录

29. 全麻术后处置措施中, 错误的是A. 仰卧头低位B. 吸氧C. 监测心电D. 观察切口E. 观察引流管
 30. 急性梗阻性化脓性胆管炎的常见原因是A. 胆囊结石B. 胆管结石C. 胆囊癌D. 胆管癌E. 胆道蛔虫
 31. 输血是救治患者重要的医疗手段, 为做好医疗服务, 保证临床治疗效果, 应当A. 使用全血B. 满足患者及家属的输血要求C. 给所有手术患者输血D. 使用成分血E. 使用3天内采集的新鲜血
 32. 大腿受伤后确诊股骨干骨折最主要的依据是A. 伤处严重淤血B. 大腿中部肿胀C. 大腿中部静脉怒张D. 大腿中部异常活动E. 伤处疼痛剧烈不敢活动
 33. 伤后表现为“银叉”样畸形的是A. 桡骨骨折B. Colles骨折C. 尺神经损伤D. 桡神经损伤E. 正中神经损伤
 34. 急性继发性化脓性腹膜炎, 最常见的原因是A. 急性阑尾炎B. 胃穿孔C. 小肠穿孔D. 胆囊炎E. 急性胰腺炎
 35. 急性感染性多发性神经炎的诊断标准之一是A. 腱反射正常B. 病后有腹泻C. 起病即出现脑脊液中白细胞分离现象D. 四肢下运动神经元瘫E. 双侧腓肠肌按痛
 36. 右侧结肠癌最多见的大体形态是A. 浸润型B. 溃疡型C. 肿块型D. 浸润溃疡型E. 弥散型
 37. 戴无菌手套时, 尚未戴无菌手套的手, 只允许接触手套的A. 外面B. 套口的向外翻折部分C. 掌面D. 套口E. 侧面
 38. 经高压蒸气灭菌的物品一般可保留A. 5天B. 7天C. 10天D. 14天E. 21天
 39. 原发性肝癌最常见的转移部位是A. 脑B. 肺C. 肝D. 骨E. 淋巴结
 40. 对于失血量小于自身血容量的20%的急性失血者, 临床医师应给予输注A. 新鲜全血1单位B. 新鲜冰冻血浆600mlC. 血小板1个治疗量D. 红细胞悬液2单位E. 晶体液和胶体液, 原则上不输血
 41. 胸骨左缘第2肋间可闻及 级连续性机器样杂音, 诊断为A. 动脉导管未闭B. 肺动脉狭窄C. 主动脉缩窄D. 右位心E. 大血管错位
 42. 膀胱刺激症的症状为A. 尿频、尿血B. 尿急、脓尿C. 尿痛、排尿困难D. 血尿、脓尿、尿频E. 尿频、尿急、尿痛
 43. 子宫内膜癌最常见的病理类型是A. 内膜样腺癌B. 透明细胞癌C. 鳞状细胞癌D. 未分化癌E. 小细胞癌
 44. 滋养细胞肿瘤最常见的转移部位是A. 肺B. 阴道C. 肾D. 肝E. 脑
 45. 前列腺增生最主要的症状是A. 进行性排尿困难B. 尿频C. 血尿D. 尿潴留E. 尿失禁
 46. 宫颈癌的临床分期依据A. 盆腔检查B. 术中探查结果C. 有无淋巴结转移D. 临床表现E. 病理检查
 47. 葡萄胎患者术后避孕首选A. 口服避孕药B. 针剂避孕药C. 埋入避孕药D. 阴茎套E. 宫内节育器
 48. 确诊为女性生殖器尖锐湿疣, 不适宜的治疗是A. 50%三氯醋酸B. 冷冻C. 激光D. 口服红霉素E. 微波
 49. 上消化道出血最常见的原因是A. 胃癌B. 消化性溃疡C. 胃黏膜脱垂D. 急性糜烂出血性胃炎E. 肝硬化食管胃底静脉曲张
 50. 宫颈糜烂的分型依据A. 糜烂深度B. 糜烂类型C. 糜烂面积D. 糜烂性质E. 糜烂位置
 51. 处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施是A. 静脉补充能量B. 温肥皂水灌肠C. 行人工破膜D. 肌肉注射哌替啶E. 静脉滴注缩宫素
 52. 输卵管妊娠最常见的着床部位为A. 伞部B. 峡部C. 壶腹部D. 间质部E. 峡部和间质部交界处
 53. 完全臀先露的特点为胎儿A. 一膝或双膝关节先露B. 双髋关节及双膝关节均屈曲C. 双髋关节及双膝关节均伸直D. 双髋关节伸直, 双膝关节屈曲E. 双髋关节屈曲, 双膝关节伸直
 54. 不属于短效口服避孕药禁忌证的是A. 哺乳期B. 慢性宫颈炎C. 乳腺癌根治术后D. 血栓性静脉炎E. 乙型病毒性肝炎
 55. 最容易发生扭转的卵巢肿瘤是A. 无性细胞瘤B. 内胚窦瘤C. 颗粒细胞瘤D. 囊性畸胎瘤E. 两性母细胞瘤
 56. HCG最高出现在A. 妊娠5—7周B. 妊娠8~10周C. 妊娠11—13周D. 妊娠14~16周E. 妊娠17—19周
 57. 急性肾小球肾炎患儿正确的饮食措施是A. 限制糖摄入B. 多食植物油C. 多饮含钾的饮料D. 少盐E. 多饮矿泉水
 58. 新生儿出生后2—4天内生理性体重可下降A. 2%B. 5%C. 8%D. 11%E. 14%

<<临床执业医师模拟试卷>>

编辑推荐

《临床执业医师模拟试卷(医学综合笔试部分)》为2009年国家执业医师资格考试之一。

<<临床执业助理医师模拟试卷>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>